



How to use Mellow Full-Spectrum 1,800mg CBD Oil? น้ำมัน ชีบีดี เมลโลว์ ฟูลสเปกตรัม 1,800mg ใช้อย่างไร

Avoid use during pregnancy or breastfeeding. Consult your doctor before using CBD oil if you are taking ACE inhibitors, beta-blockers, or diuretics.

ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน CBD หากคุณกำลังใช้ยา กลุ่ม ACE inhibitors, beta-blockers, หรือยาขับปัสสาวะ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร

Mellow CBD Oil contains 1,800mg of CBD per 30ml. bottle

เมลโลว์ ชีบีดี ความจุขวดละ 30 มิลลิลิตร และมีปริมาณสาร ชีบีดี 1,800 มิลลิกรัมต่อขวด

1ml. of Mellow CBD oil contains 60mg in CBD

มีปริมาณของสาร ชีบีดี ที่ 60 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร ของเมลโลว์ ชีบีดี

Scale application tube indicator of 0.25 - 1ml. per pump

หลอดหยดมีมาตรวัดสากลที่ความจุ 0.25 - 1 มิลลิลิตรต่อหนึ่งหลอดบีบ

Dosage/ปริมาณและวิธีใช้

Shake well before use. Suggest applying under the tongue for 30-60 seconds before swallowing or followed by water. Apply per dosage guidelines below

เขย่าขวดก่อนใช้ หยดใต้ลิ้นทิ้งไว้ 30-60 วินาทีก่อนกลืนหรือดื่มน้ำตาม ใช้ปริมาณตามที่ระบุไว้ตามอาการ

Promote better sleep: start with 0.25ml. For the first 3 nights, scale up to 0.5ml. within the first 7 days. You should feel the effect from the 1st day of use and the full result within 3 days of use.

ช่วยเรื่องการนอนหลับ: เริ่มที่ 0.25ml. สำหรับ 3 คืนแรก และเพิ่มปริมาณเป็น 0.5ml. ภายในหนึ่งอาทิตย์แรกของการใช้ คุณจะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในคืนแรก และผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นภายใน 3 วันที่ใช้

Anxiety, Depression, Bipolar, OCD, and PTSD: Distribute 1ml throughout the day. Suggest starting with 0.25ml. per dose, 3 times a day; Morning, Afternoon, Evening, and Night. Monitor the effectiveness and adjust the dosage accordingly. We are here if you need anything.

ลดความกังวลและโรคซึมเศร้า: เข้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน รอบละ 0.25ml. เพิ่มปริมาณการใช้เป็น 0.5ml. ต่อรอบถ้ายังไม่ดีขึ้นจากความกังวลและโรคซึมเศร้า ต้องใช้ติดต่อกันเกินหนึ่งอาทิตย์ถึงจะเห็นผล ติดต่อเราได้ทุกเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

Control mood spike: Take 0.5 - 1ml. to stabilize mood/emotions when encountering an event

จัดการเพื่อปรับอารมณ์: ใช้ 0.25 - 0.5ml. เพื่อจัดการกับระดับของอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้อารมณ์ขึ้นหรือลงมากเกินไป

Chronic Pain Management: 0.25ml. every 4 hours 4-6 times a day and monitor the effectiveness and adjust the dosage accordingly.

จัดการอาการปวดเรื้อรัง: 0.25ml. ทุกๆ 4 ชม. 4-6 ครั้งต่อวัน สามารถเพิ่มปริมาณเป็น 0.5ml., 0.75ml. หรือ 1.5ml ถ้าอาการปวดยังไม่ดีขึ้น

Recover from Intense exercise, Accident, or Surgery: Use 0.25ml. immediately after exercise or before bed

เพื่อการฟื้นตัวจากการออกกำลังกายหนัก หรือหลังอุบัติเหตุ หรือหลังการผ่าตัด: ใช้ 0.25ml. ทันทีหลังออกกำลังกายหรือก่อนนอน

Migraine, Parkinson's disease, Epilepsy, Neuralgia, and other nerve-related disorders. We have users who have been reporting successful relief from the symptoms but the base dosage needs to be discovered individually. We can help you through this process - contact us

โรคไมเกรน, พาร์กินสัน, โรคลมชัก, หรือโรคระบบประสาทอื่นๆ: เรามีผู้ใช้ที่รายงานว่าใช้ได้ผลดี แต่ต้องเป็นปริมาณที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนนั้นๆ เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเพิ่มปรับขนาดการใช้ให้ตรงกับคุณ

Contact us to help adjust the dosage at Facebook/LINE: @mellowhemp

ติดต่อเราได้ทั้ง Facebook/LINE @mellowhemp เพื่อปรึกษาหรือปรับขนาดการใช้