


INSTRUCCIONES DE USO

BAQSIMI™

(glucagón) polvo nasal
3 mg

Lea las Instrucciones de uso de BAQSIMI antes de usarlo. BAQSIMI se usa para tratar niveles muy bajos de azúcar en la sangre (hipoglucemia severa) que pueden hacer que necesite ayuda de otras personas. Debe asegurarse de mostrar a sus cuidadores, familiares y amigos dónde guarda BAQSIMI y explicar cómo usarlo compartiendo estas instrucciones. **Ellos necesitan saber cómo usar BAQSIMI antes de que ocurra una emergencia.**


Tubos y Partes del Dispositivo



Información Importante a Conocer

- **No** retire la Envoltura de Plástico ni abra el Tubo hasta que esté listo para usarlo.
- Si el Tubo se ha abierto, BAQSIMI podría estar expuesto a la humedad. **Esto podría hacer que BAQSIMI no funcione como se espera.**
- No empuje el émbolo ni pruebe BAQSIMI antes de estar listo para usarlo.
- BAQSIMI contiene 1 dosis de glucagón en polvo nasal y **no** puede reutilizarse.
- BAQSIMI es sólo para uso nasal (nariz).
- BAQSIMI funcionará incluso si tiene un resfriado o está tomando medicamentos para el resfriado.


Preparando la Dosis




- Retire la Envoltura de Plástico jalando de la franja roja.

-
- Abra la Tapa y retire el Dispositivo del Tubo.
Precaución: No presione el Émbolo hasta que esté listo para administrar la dosis.

Administrando la Dosis



- **Sostenga el Dispositivo** entre dedos y pulgar.
- **No empuje el Émbolo** todavía.



- **Inserte la Punta** suavemente en una fosa nasal hasta que el (los) dedo(s) toque(n) el exterior de la nariz.




- **Empuje el Émbolo** firmemente hasta el fondo.
- **La dosis está completa cuando la Línea Verde desaparece.**

Después de administrar BAQSIMI

- Llame para obtener ayuda médica de emergencia de inmediato.
- Si la persona está inconsciente, ponga a la persona de lado.
- **Deseche el Dispositivo y el Tubo usados.**
- Anime a la persona a comer lo antes posible. Cuando puedan tragar con seguridad, dele a la persona una fuente de azúcar de acción rápida, como un jugo. Luego anime a la persona a comer una merienda, como galletas (crackers) con queso o mantequilla de maní.
- Si la persona no responde después de 15 minutos, se puede administrar otra dosis, si está disponible.

Almacenamiento y Manipulación

- **No retire la Envoltura de Plástico ni abra el Tubo hasta que esté listo para usarlo.**
- Guarde BAQSIMI en el Tubo envuelto en plástico a temperaturas de hasta 86° F (30°C).
- Reemplace BAQSIMI antes de la fecha de caducidad impresa en el Tubo o caja.



Otra información

- **Precaución: Reemplace el BAQSIMI usado de inmediato para que tenga un nuevo BAQSIMI en caso de que lo necesite.**
- Mantenga BAQSIMI y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Para preguntas o más información sobre BAQSIMI

- Llame a su proveedor de atención médica
- Llame a Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979)
- Visite www.baqsimi.com

BAQSIMI es una marca registrada de Eli Lilly and Company.

Comercializado por: Lilly USA, LLC

Indianapolis, IN 46285, USA

Copyright © 2019, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

~~El dispositivo BAQSIMI cumple con todos los requisitos aplicables definidos en ISO 20072~~

Estas Instrucciones de Uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Emitido: Julio 2019

BAQ-0001-IFU-20190724

El logo de Lilly, que consiste en la palabra "Lilly" escrita en una tipografía cursiva roja.