

thuốc afstyla chữa bệnh gì

chảy máu sau mổ

chảy máu nhiều

Thuốc Afstyla: Công dụng, chỉ định và lưu ý khi dùng

Thuốc Afstyla được sử dụng để kiểm soát và ngăn chặn các đợt chảy máu ở những người có yếu tố VIII (hemophilia A) ở mức thấp. Thuốc này cũng được sử dụng ở những bệnh nhân này trước khi phẫu thuật để ngăn ngừa chảy máu.

1. Cách sử dụng Afstyla Vial

Thuốc Afstyla được dùng bằng đường tiêm vào tĩnh mạch theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thuốc có thể cần được tiêm chậm hơn trong thời gian dài hơn tùy thuộc vào liều lượng và cách người bệnh đáp ứng với thuốc.

Thuốc Afstyla được sử dụng ở những người có yếu tố VIII ở mức thấp có nguy cơ bị chảy máu lâu hơn sau chấn thương/phẫu thuật và chảy máu bên trong cơ thể (đặc biệt là vào khớp và cơ). Sản phẩm này chứa một dạng nhân tạo của yếu tố VIII, được sử dụng để thay thế tạm thời yếu tố VIII bị thiếu, một loại protein ([yếu tố đông máu](#)) thường có trong máu nhằm mục đích điều trị và ngăn ngừa chảy máu.

Thuốc này không nên được sử dụng để điều trị bệnh von Willebrand (rối loạn đông cầm máu).

Sau lần đầu tiên nhận thuốc này tại trung tâm điều trị hoặc bệnh viện, một số bệnh nhân có thể tự sử dụng thuốc này tại nhà. Nếu bác sĩ hướng dẫn bạn sử

dụng thuốc này tại nhà, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của bác sĩ trước khi bạn bắt đầu sử dụng thuốc này và mỗi lần bạn lấy lại thuốc. Học cách cất giữ và vứt bỏ kim tiêm và vật dụng y tế một cách an toàn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

Nếu thuốc và dung dịch dùng được để trong tủ lạnh, hãy để cả 2 về nhiệt độ phòng trước khi kết hợp cùng nhau. Sau khi thêm dung dịch vào bột, nhẹ nhàng khuấy hỗn hợp để bột tan hoàn toàn. Đừng lắc. Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy kiểm tra bằng mắt thường các hạt hoặc sự đổi màu. Nếu có, không sử dụng chất lỏng. Sử dụng ngay theo hướng dẫn của sản phẩm.

Liều lượng dựa trên tình trạng sức khỏe của bạn, cân nặng, [kết quả xét nghiệm máu](#) và phản ứng với điều trị. Thực hiện theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.

Hãy cho bác sĩ biết nếu tình trạng của bạn không cải thiện hoặc nếu ngày càng trở nên xấu đi.

2. Phản ứng phụ

Sử dụng thuốc Afstyla đôi khi có thể xảy ra một số tác dụng phụ như đỏ bừng mặt, [đau đầu](#), buồn nôn và tim đập nhanh. Có thể giảm bớt các triệu chứng này bằng cách tiêm thuốc này chậm hơn. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể bị bỏng/đỏ/kích ứng tại chỗ tiêm, sốt và ớn lạnh. Nếu xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ nào kéo dài hoặc trở nên trầm trọng hơn, hãy báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết ngay lập tức.

Bác sĩ quyết định kê đơn thuốc này cho bạn là bởi vì họ đã đánh giá rằng lợi ích mang lại cho bạn lớn hơn nguy cơ tác dụng phụ. Nhiều người sử dụng thuốc này không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào xảy ra.

Thuốc Afstyla hiếm khi gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng. Tuy nhiên, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong các phản ứng sau, bao gồm: Phát ban, ngứa/sưng (đặc biệt là mặt/lưỡi/cổ họng), chóng mặt nghiêm trọng, [khó thở](#), tức ngực/tức ngực.

Có thể xuất hiện những tác dụng ngoài mong muốn chưa được liệt kê ở trên đây. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy có bất cứ biểu hiện nào không bình thường sau khi tiêm, hãy liên hệ ngay với bác sĩ để được xử lý kịp thời.

3. Các biện pháp phòng ngừa

Trước khi sử dụng thuốc Afstyla, nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ sản phẩm nào có yếu tố VIII hay bất cứ dị ứng nào khác, hãy báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ được biết. Một số nhãn hiệu cũng có thể chứa polyethylene glycol (PEG), hoặc các thành phần không hoạt động (chẳng hạn như cao su tự nhiên/latex) có thể gây phản ứng [dị ứng thuốc](#) hoặc các vấn đề khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với bác sĩ điều trị.

Bạn cần cung cấp đầy đủ tiền sử bệnh của bản thân trước khi sử dụng thuốc này. Các nhà sản xuất của một số nhãn hiệu thuốc này khuyên người bệnh nên theo dõi [nhịp tim](#) của mình trong quá trình điều trị. Nếu tim bắt đầu đập nhanh hơn, người bệnh cần tiêm này chậm hơn hoặc tạm thời ngừng truyền dịch cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường.

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai chỉ nên sử dụng loại thuốc này trong trường hợp thật sự cần thiết. Thảo luận về những rủi ro và lợi ích mà bạn sẽ nhận được với bác sĩ điều trị.

Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định được liệu thuốc Afstyla có gây ảnh hưởng nào đến sữa mẹ hay không, do đó, phụ nữ đang cho con bú cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng loại thuốc này.

4. Tương tác của thuốc

Trước khi được kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ, tuyệt đối không bắt đầu sử dụng, dừng hoặc thay đổi liều lượng của bất kỳ loại thuốc nào.

Gửi tên tất cả các sản phẩm thảo dược, các loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn mà bạn đang sử dụng cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết trước khi sử dụng loại thuốc này.

Nếu bạn đã sử dụng quá liều và xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như ngất đi hoặc khó thở, hãy liên hệ ngay với trung tâm cấp cứu.

Các xét nghiệm máu phòng thí nghiệm (ví dụ, mức độ yếu tố VIII) nên được thực hiện thường xuyên để xác định liều lượng thuốc mà bạn sử dụng và để kiểm tra hiệu quả hoạt động của loại thuốc này.

Điều quan trọng để phát huy tác dụng hiệu quả nhất của thuốc là bạn phải tuân theo lịch dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bạn bỏ lỡ một liều, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn để thiết lập một lịch trình dùng thuốc mới. Đừng sử dụng gấp đôi liều để bắt kịp tiến độ.

Afstyla cần được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bảo vệ sản phẩm khỏi ánh sáng. Sau khi pha dung dịch, sử dụng sản phẩm trong khung thời gian được nêu trong hướng dẫn của nhà sản xuất và vứt bỏ phần không sử dụng. Tránh xa tầm tay của trẻ em.

Trừ khi được hướng dẫn làm như vậy, không được tự ý xả thuốc xuống bồn cầu hoặc đổ vào cống. Vứt bỏ sản phẩm này đúng cách khi nó đã hết hạn hoặc không còn cần thiết. Vứt bỏ kim trong một hộp kim. Không sử dụng lại kim trong các lần sử dụng sau.

Nếu được bảo quản ở nhiệt độ phòng, hãy vứt bỏ mọi lọ thuốc chưa sử dụng sau 3 tháng hoặc sau ngày hết hạn, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Nguồn tham khảo: webmd.com

Tags: Thuốc afstyla chữa bệnh, Chảy máu sau mổ, Chảy máu nhiều, Thuốc afstyla, Sử dụng thuốc an toàn