

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 29 квітня - 05 травня 2022 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – кущення. Озимий ріпак – бутонізація-початок цвітіння. Ярий ячмінь – сходи. Горох – сходи. Сад – бутонізація-початок цвітіння.

Протягом звітнього періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 31 % обстежених площ, хлібними клопами за середньої чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 23 % обстежених площ, хлібною п'явицею за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 12 % обстежених площ, злаковими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 22 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 3 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 2 % рослин на 19 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових мух: шведські мухи – в середньому 6 екз. на 100 п.с., гессенська муха – 11 екз. на 100 п.с., пшенична муха – 8 екз. на 100 п.с. на 21-25 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 3 екз. на 100 п.с. заселено 17 % обстежених площ. Борошнистою россою уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 20 % обстежених площ, бурою іржею уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 8 % обстежених площ, септоріозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 26 % обстежених площ (1912 га).

В посівах озимого ячменю початок заселення злаковими блішками за середньої чисельності 1,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 17 % обстежених площ, хлібною п'явицею за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин на 8 % обстежених площ. В теплі сонячні дні спостерігається літ злакових мух: шведські мухи – в середньому 9 екз. на 100 п.с., гессенська муха – 11 екз. на 100 п.с., пшенична муха – 12 екз. на 100 п.с. на 8 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 1 екз. на 100 п.с. заселено 8 % обстежених площ. Борошнистою россою уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 17 % обстежених площ, гельмінтоспоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 8 % обстежених площ (1156 га).

В посівах ячменю злаковими блішками за середньої чисельності 10 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 7 % рослин на 100 % обстежених площ, хлібною п'явицею за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 100 % обстежених площ. Ринхоспоріозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 100 % обстежених площ (80 га).

В посівах гороху бульбичковими довгоносіками за середньої чисельності 1,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 100 % обстежених

площ, піщаним мідляком за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 64 % обстежених площ (282 га).

В посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками за середньої чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 58 % обстежених площ; капустяним стебловим прихованохоботником за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 47 % обстежених площ, яйцекладками шкідника в середній чисельності 3 яйця на рослину заселено 2 % рослин; ріпаковим листоїдом за середньої чисельності 0,9 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 17 % обстежених площ; ріпаковим насіннєвим прихованохоботником в середній чисельності 8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 28 % обстежених площ; ріпаковим квіткоїдом в середній чисельності 6 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 52 % обстежених площ; оленкою волохатою в середній чисельності 3 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 52 % обстежених площ. Альтернаріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 40 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 9 % обстежених площ (547 га).

В плодівих садах золотогузом за середньої чисельності 1 екз. на п.м.г. в середньому пошкоджено 2 % листків на 10 % дерев на 100 % площ, яблуневим квіткоїдом пошкоджено 2 % бутонів на 20 % дерев за щільності шкідника 2,5 екз. на дерево на 100 % площ (4 га).

На неорних площах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію 9 на 100 % площ (2 га).