BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Oxacillin**

I. Phổ kháng khuẩn:

- Oxacilin là một kháng sinh bán tổng hợp, thuộc nhóm các penicilin không bị mất hoạt tính bởi penicilinase (penicilin kháng penicilinase).
- Oxacilin có tác dụng với nhiều chủng *Staphylococcus aureus* và *S. epidermidis* sinh penicilinase đã kháng lại hầu hết các loại penicilin hiện có.
- Oxacillin không có tác dụng với các chủng vi khuẩn tụ cầu kháng Methicillin.

II. Liều dùng:

- Người lớn:
  - Uống 500mg cách 6 giờ
  - Tiêm tĩnh mạch chậm 1g cách 6 giờ.
- Trẻ sơ sinh: tham khảo cụ thể liều dùng trong Hướng dẫn điều trị bệnh viện Hùng Vương

III. Cách dùng:

- Tiêm tĩnh mạch: pha 1 lọ 1g trong 10ml nước cất pha tiêm

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai: tương thích
- Phụ nữ cho con bú: tương thích

V. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Bột pha tiêm Oxacillin 1g
- Viên uống Euvioxcin 500mg

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022*
2) *Lexicomp*
3) *Drugs in Pregnancy and Lactation 2021*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Trần Thu Hoà Phụng **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**