

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 10 по 16 травня 2024 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – вихід в трубку, прапорцевий лист. Озимий ріпак – кінець цвітіння, поява стручків. Горох – утворення вусиків, бутонізація. Соняшник, кукурудза – сходи. Сад – поява плодів. Картопля – сходи.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці злаковими блішками за середньої чисельності 9 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 67 % обстежених площ, хлібними клопами за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 43 % рослин на 26 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 1 екз. на кв.м на 8 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 4 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 5 % рослин на 68 % обстежених площ, хлібною п'явицею за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 25 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 2 яйця на рослину на 8 % обстежених площ, личинками хлібної п'явиці за середньої чисельності 0,8 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин на 24 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових мух: гессенська муха в середньому 13 екз. на 100 п.с., шведські мухи в середньому 8 екз. на 100 п.с., пшенична муха в середньому 13 екз. на 100 п.с. на 33-49 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 2 екз. на 100 п.с. заселено 15 % обстежених площ. Борошнистою россою уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 49 % обстежених площ, бурю іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 9 % обстежених площ, септоріозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 100 % обстежених площ (1252 га).

В посівах озимого ячменю злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 100 % обстежених площ, хлібною п'явицею за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 51 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 2 яйця на рослину на 51 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимого ячменю спостерігається літ злакових мух: гессенська муха в середньому 18 екз. на 100 п.с., шведські мухи в середньому 14 екз. на 100 п.с., пшенична муха в середньому 15 екз. на 100 п.с. на 14-18 % від обстежених площ (195 га).

В посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками за середньої чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 17 % обстежених площ, капустиним стебловим прихованохоботником за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 17 % обстежених площ, ріпаковим насіннєвим прихованохоботником в середній чисельності 1,7 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 26 % обстежених площ; оленкою волохатою в середній чисельності 3 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 33 % обстежених площ, ріпаковим квіткоїдом в середній чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 29 % обстежених площ. Альтернاریозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 76 % обстежених площ (572 га).

В посівах гороху піщаним мідляком за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 100 % обстежених площ (7 га).

В посівах соняшнику дротяниками в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 15 % обстежених площ, піщаним мідляком в середній чисельності 1,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ, сірим довгоносом за середньої чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 17 % обстежених площ (513 га).

В посівах кукурудзи піщаним мідляком за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 20 % обстежених площ (250 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 2 екз. на кущ заселено і пошкоджено 35 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 4 % кущів (присадибні ділянки).

В плодівих садах яблуневою міллю заселено 10 % дерев в середній чисельності 1 гніздо/дерево в середньому пошкоджено 1 % листків на 100 % площ (4 га).