

3.สรุปผลการดำเนินงานควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

3.1 ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (DM)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)			
	2563	2564	2565	2566
1) ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน				
2) ร้อยละของประชากรอายุ 35-59 ปี ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน				
3) ร้อยละของประชากรกลุ่ม Pre-DM (ภาวะก่อนเบาหวาน) ในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำ				
4) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม Pre-DM(ภาวะก่อนเบาหวาน) ปีที่ผ่านมา				
5) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน				
6) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยัน				
7) อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสนประชากรในปีงบประมาณ				
8) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับการรักษาต่อเนื่อง				
9) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง รอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2)				
10) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี				
11) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี				
12) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์				
13) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL				
14) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl				

15) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา				
16) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า				

3.1 ผลการดำเนินงานโรคเบาหวาน(ต่อ)

โรคเบาหวาน (DM)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)			
	2563	2564	2565	2566
17) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต				
18) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต				
19) ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน				

3.2 ผลการดำเนินงานโรคความโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง (HT)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)			
	2563	2564	2565	2566
1) ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง				
2) ร้อยละของประชากรอายุ 35-59 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง				
3) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง				
4) ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วย				
5) ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้ที่มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์เกือบสูง (กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง)				
6) ร้อยละของผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ≥ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ≥ 110 มม.ปรอท จากการคัดกรอง ได้รับการวินิจฉัยความดันโลหิต				
7) ร้อยละของผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ≥ 180 มม.ปรอท และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ≥ 110 มม.				

ปรอท จากการคัดกรองและได้วัดความดันโลหิตซ้ำภายใน 7 วัน ได้รับการวินิจฉัย				
8) อัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากรในปีงบประมาณ				
9) ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับการรักษาต่อเนื่อง				
10) ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี				