

ПЛАН ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ “ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ”

Решение о госпитализации и лечении после консультации нашего специалиста.

Обследование можно пройти в нашей поликлинике или по месту жительства.

Для подготовки к оперативному лечению требуется следующее:

1. Лабораторные исследования:

- Общий анализ крови - 2 недели;
- Общий анализ мочи – 2 недели;
- Свободный и связанный, общий билирубин, общий белок, альбумин, АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТ, калий, натрий, креатинин, мочевины крови, мочевая кислота – 2 недели;
- Липидный состав крови (ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП) – 2 недели;
- Коагулограмма (ПТИ, ПТВ, МНО, фибриноген, АЧТВ) – 2 недели;
- Группа крови, резус-фактор - срок годности не ограничен;
- ВИЧ – 1 месяц;
- HBS-антиген – 1 месяц;
- HCV – 1 месяц;
- Реакция Вассермана – 1 месяц;
- Гликированный гемоглобин – 2 месяца;
- Глюкозотолерантный тест- 2 месяца;
- ТТГ, Т4 свободный, пролактин, кальций, паратгормон — 2 месяца
- Кортизол слюны или ночной подавляющий тест с 2 мг дексаметазона, или суточная экскреция свободного кортизола с мочой – 2 месяца;
- Витамин В1, В12, 25 (ОН) витамин D, фолиевая кислота, сыв железо, цинк, медь – годность 2 месяца. Сдать в первую очередь!

Для всех пациентов перед операцией:

2. Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с микробиологическим исследованием биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (*Helicobacter pylori*) или определение ДНК хеликобактер пилори (*Helicobacter pylori*) в биоптатах слизистой желудка методом ПЦР - 2 месяца
3. ЭКГ – 2 месяца.
4. Эхо-КГ – 2 месяца.
5. УЗИ органов брюшной полости – 2 месяцев.
6. УЗИ почек и надпочечников – 2 месяцев.
7. УЗИ щитовидной железы – 2 месяцев.
8. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей – 2 месяцев.
9. Рентгенография органов грудной клетки — 1 месяц
10. Консультация терапевта (пройти после сдачи всех анализов и обследований)
11. Консультация эндокринолога (пройти после сдачи анализов и обследований.)
12. Консультация психиатра- годность 2 месяца
13. Для женщин: – Консультация гинеколога – 2 месяца;
– УЗИ малого таза – 2 месяцев
14. Консультация сомнолога + СИПАП - диагностика (для пациентов с ночным апноэ - затруднение, остановки дыхания во сне и пациентам с ИМТ более 50).
15. **Для пациентов с сахарным диабетом типа II, кроме того:**
Инсулин- 2 месяца
С-пептид- 2 месяца
16. Контроль АД, пульса в течении 2х недель до операции.