

Урок 8

Визначення маси і розмірів небесних тіл**Мета уроку:****навчальна:**

- сформувати знання учнів різні способи визначення маси і розмірів небесних тіл;

розвивальна:

- розвивати критичне мислення;
- розвивати предметну компетентність та міжпредметні зв'язки.

виховна:

- сприяти формуванню світоглядних ідей про пізнаванність світу;
- виховувати свідоме ставлення до вивчення предмету, здійснювати патріотичне виховання.

Тип уроку: комбінований**Хід уроку**

У всіх областях природи ...
панує певна закономірність,
незалежна від існування мислячого людства.

/Макс Планк/

I. Організаційний момент**II. Повторення та перевірка знань учнів****Диктант**

1. Учений, основоположник геліоцентричної системи світу (М. Коперник)
2. Найближча точка орбіти. (Перигей)
3. Значення 149600000км відповідає ... (1 а. о.=149600000км)
4. Основні закони небесної механіки. (ЗВТ, закони Кеплера)
5. В якій точці еліптичної орбіти найменша швидкість? (В апогеї)
6. Німецький астроном, який відкрив закони руху планет (Й. Кеплер)
7. Формула третього закону Кеплера.
8. Відношення квадратів періодів обертання двох планет дорівнює 8. Чому дорівнює відношення їх великих півосей.(2)
9. У якій конфігурації на мінімальну відстань до Землі підходить нижня планета? (У нижньому сполученні)

10. У якій конфігурації на мінімальну відстань до Землі підходить верхня планета? (У протистоянні)

11. Які планети можуть проходити по диску Сонця? (Меркурій, Венера)

III. Мотивація навчальної діяльності. Формулювання теми і завдань уроку

IV. Вивчення нового матеріалу

Визначення розмірів, мас небесних тіл і відстаней до них у Сонячній системі.

Визначення відстаней методом горизонтального паралаксу.


Середню відстань від усіх планет до Сонця в астрономічних одиницях можна обчислити, використовуючи третій закон Кеплера. Із 40-их рр. XX ст. радіотехніка дала змогу визначити відстані до небесних тіл за допомогою радіолокації. Та класичним способом визначення відстаней був і залишається кутомірний геометричний спосіб. Ним визначають відстані й до далеких зір, до яких метод радіолокації застосувати неможливо. Геометричний метод ґрунтується на явищі паралактичного зміщення.

Паралактичне зміщення (паралакс світила) - удаване зміщення світила, обумовлене переміщенням спостерігача. Визначення відстаней до тіл Сонячної системи ґрунтується на вимірюванні їхніх горизонтальних паралаксів.

*Кут p , під яким зі світила видно радіус Землі, перпендикулярний до променя зору, називають **горизонтальним паралаксом**.*

Знаючи горизонтальний паралакс світила, можна визначити його відстань $D=SO$ від центра Землі.

Визначення відстані до світила методом горизонтального паралаксу:

$D = \frac{R_3}{\sin p}$ $D = \frac{206265'' R_3}{p''}$ де $D=SO$, R_3 - радіус Землі	 Мал. Що більша відстань до світила, то менший кут p.
--	--

Прийнявши R_3 за одиницю, можна виразити відстань до світила в земних радіусах. Наприклад, паралакс Сонця $p_{\odot} = 8,794''$. Паралаксу Сонця відповідає середня відстань від Землі до Сонця, приблизно 149,6 млн. км. Цю відстань приймають за одну астрономічну одиницю (1 а.о.).

В астрономічних одиницях зручно вимірювати відстані між тілами Сонячної системи.


При малих кутах $\sin p \approx p$, якщо кут виражений в радіанах. Якщо p виражено в секундах дуги, то вводиться множник $\sin 1'' = \frac{1}{206265''}$, де 206265 - число секунд в одному радіані. Тоді $\sin p = p'' \sin 1'' = \frac{p''}{206265''}$ і $D = \frac{206265'' R_3}{p''}$. Це рівняння значно спрощує обчислення відстані D до світила за відомим паралаксом p .

Під час спостереження небесних тіл Сонячної системи можна виміряти кут, під яким їх видно спостерігачеві із Землі. Знаючи кутовий радіус ρ об'єкта і відстань D до об'єкта, можна обчислити лінійний радіус R цього об'єкта за формулою: $R = D \sin \rho$.

Визначення лінійних розмірів тіл Сонячної системи:

$$R = D \sin \rho$$

$$R = \frac{\rho''}{p''} R_3$$



За визначенням горизонтального паралакса, радіус землі видно зі світила під кутом p , тоді одержимо: $R = \frac{\sin \rho}{\sin p} R_3$. Оскільки значення кутів ρ і p малі, остаточно маємо: $R = \frac{\rho''}{p''} R_3$. Визначити розміри небесних тіл таким способом можна тільки тоді, коли видно їхні диски.

Щоб визначити лінійний розмір небесного тіла, потрібно виміряти кут, під яким ми бачимо його радіус, і знати відстань до нього. На рис. 6.1 спостерігач із центру ТЗемлі може бачити лише лінійний радіус R тіла під кутом ρ .

Відстань від центра Землі до центра небесного тіла позначимо літерою D . Тоді: $R = D \cdot \sin(p)$.

Якщо D виразити в радіусах Землі, то й R ми знайдемо в радіусах Землі. Якщо D виразити в кілометрах, то R вийде в кілометрах.

Наприклад, відстань до Місяця D дорівнює 60 земним радіусам, а радіус Місяця ми бачимо під кутом $16'$. Для Місяця $R = 60 \cdot \sin(16') = 0,27$ радіуса Землі.

Радіолокаційний метод.

Для визначення відстаней до тіл Сонячної системи використовують найбільш точні методи вимірювання - радіолокаційні вимірювання.



Мал. Радіолокаційна станція



Мал. Принцип роботи радіолокаційної станції

Вимірявши час t , потрібний для того, щоб радіолокаційний імпульс досяг небесного тіла, відбився і повернувся на Землю, визначають відстань D до цього тіла за формулою $D = \frac{ct}{2}$.

Визначення відстані до тіл Сонячної системи радіолокаційним методом:

$$D = \frac{ct}{2}$$

де $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с} = 299\,792\,458 \text{ м/с}$ - швидкість світла.

За допомогою радіолокації визначено найбільш точні значення відстаней до тіл Сонячної системи, уточнено відстані між материками Землі, більш точно визначено астрономічну одиницю. Методи лазерної локації (наприклад, спеціальні кутові відбивачі, доставлені на Місяць) дали змогу виміряти відстань від Землі до Місяця з точністю до кількох сантиметрів.

На тіло масою m , яке розташоване поблизу поверхні Землі, діє сила тяжіння $F = mg$, де g — прискорення вільного падіння. Якщо тіло рухається лише під дією сили тяжіння, то застосовують закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння, спрямоване до центру Землі, обчислюють за формулою:

$$g = G \frac{M}{R_{\oplus}^2}$$

(1)


Отже, знаючи, що прискорення вільного падіння $g = 9,81 \text{ м/с}^2$, $G = 6,673 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$ і радіус Землі $R_{\oplus} = 6370 \text{ км}$, можна за формулою (2) обчислити масу Землі (3).

$$M = \frac{gR_{\oplus}^2}{G} \quad (2)$$

$$M = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ кг} \quad (3)$$

ОБЧИСЛЕННЯ МАС НЕБЕСНИХ ТІЛ ЗА ТРЕТІМ УЗАГАЛЬНЕНИМ ЗАКОНОМ КЕПЛЕРА

Перед тим, як розглянути такий спосіб визначення мас небесних тіл, перевіримо виконання третього закону Кеплера для випадку колового руху планети зі швидкістю v_k .



Нехай тіло масою m рухається з лінійною швидкістю v_k навколо тіла M ($m \ll M$) по колу радіуса r_k . Це можливо, якщо рух відбувається під дією сили, яка створює стрімке прискорення $a = \frac{v_k^2}{r_k}$. Сила, яка створює прискорення, є сила тяжіння, що дорівнює: $\frac{GMm}{r_k^2}$.

Дорівнюючи $\frac{v_k^2}{r_k}$ до прискорення $\frac{GM}{r_k^2}$, створеного тяжінням, отримуємо:

$$v_k^2 = \frac{GM}{r_k}$$

Якщо період обертання тіла m навколо тіла M складає час T , то лінійна швидкість цього тіла по орбіті дорівнює:

$$v_k = \frac{2\pi r_k}{T}$$

Підставляючи $v_k = \frac{2\pi r_k}{T}$ у $v_k^2 = \frac{GM}{r_k}$, отримуємо $\left(\frac{2\pi r_k}{T}\right)^2 = \frac{GM}{r_k}$, або

$$\frac{r_k^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$$

Для еліптичного руху формула $\frac{r_g^2}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$ також є справедливою, якщо замість радіуса кола r_g підставити велику піввісь a еліптичної орбіти. У такому випадку отримаємо співвідношення:

$$\frac{a^3}{T^2 M} = \frac{G}{4\pi^2}$$

яке можна сформулювати таким чином: відношення куба великої півосі орбіти тіла до квадрата періоду його обертання й маси центрального тіла є величиною незмінною.

Якщо масою m меншого тіла не можна нехтувати у порівнянні з масою M центрального тіла, то в третій закон Кеплера, як показав Ньютон, замість маси M увійде сума мас та співвідношення $\frac{a^3}{T^2(M+m)} = \frac{G}{4\pi^2}$ буде записано у вигляді:

$$\frac{a^3}{T^2(M+m)} = \frac{G}{4\pi^2}$$

Узагальнимо формулу $\frac{a^3}{T^2(M+m)} = \frac{G}{4\pi^2}$ для двох небесних тіл масами M_1 і M_2 , отримаємо уточнений третій закон Кеплера:

$$\frac{T_1^2(M_1+m_1)}{T_2^2(M_2+m_2)} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$

2

Тобто квадрати сидеричних періодів супутників (T_1^2 і T_2^2), помножені на суму мас головного тіла й супутника ($M_1 + m_1$ і $M_2 + m_2$), відносяться як куби великих півосей орбіт супутників (a_1^3 і a_2^3).

На основі уточненого Ньютоном третього закону Кеплера можна обчислити маси планет, що мають супутники, а також обчислити масу Сонця.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Запитання 1,2 (§6.)
2. Задача. Чому дорівнює лінійний діаметр Місяця, якщо його видно з відстані 400000 км під кутом $0,5^\circ$?
3. Задача. Визначте період обертання Марса навколо Сонця, якщо його протистояння відбуваються кожні 780 діб.
4. Задача. Визначте відстань від Сонця до Урана, якщо період обертання Урана навколо Сонця 84 роки.

VI. Підсумок уроку

Вправа «Сьогодні на уроці я...»

- навчився...,
- переконався...,
- зрозумів...,
- зумів...,
- зробив для себе висновок..., і т.д.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати тему 1

Для допитливих

В астрофізиці одиницею для вираження й порівняння мас зір та інших астрономічних об'єктів (зокрема, галактик) є маса Сонця. Вона позначається через $M_{\odot}$ і дорівнює масі Сонця: $M_{\odot} = (1,98847 \pm 0,00007) \cdot 10^{30}$ кг.

Сонячна маса перевищує масу Землі майже в 332 946 разів. Близько 99,86% маси Сонячної системи припадає саме на Сонце, а загальна маса усіх планет становить лише $0,0013 M_{\odot}$, причому більша частина сумарної маси планет належить Юпітеру (його маса у 1047,56 разів менша за сонячну).

Маса більшості окремих зір у Всесвіті складає від $0,08$ до $50 M_{\odot}$, а маса чорних дір і цілих галактик може сягати мільйонів і мільярдів мас нашого світила.

