

Что должно быть внутри:

1. Бинт широкий и узкий, термометр, пинцет, пластырь, шприцы (2,5,10,20 мл, инсулиновые).
2. Антисептик. Для поверхностных повреждений кожи лучше подойдет раствор бетадина 10%, для слизистых оболочек — хлоргексидин 0,05% или мирамистин 0,01%.
3. Ампулы 40% глюкозы, особенно если у Вас карликовой породы собачка или новорожденный питомец. Если малыш или животное мини-породы пропустили прием пищи по каким либо причинам и выглядят вялыми, то выпоив несколько миллилитров такого раствора, у вас будет время разобраться или доехать до клиники.
4. Витамин B6 (пиридоксин) - в случае отравление изониазидом, примерно 10 мл (10 ампул по 1 мл) набрать в один большой шприц и ввести внутримышечно
5. Сорбент. Лучше всего подходит энтеросгель, полисорб. Хорошо подходят при пищевых отравлениях и диарее. При подозрении на инфекционное желудочно-кишечное заболевание категорически не рекомендуются препараты, действующим веществом которых является лоперамид.
6. Спазмолитик. При наличии спазмов — мочевоводящих путей, кишечника и т.д. обычно применяется но-шпа или бускопан
7. Жаропонижающее, оно же — обезболивающее. Желательно использовать ветеринарные препараты, причем, последнего поколения: превикокс, мелоксидил, трококсил. Также самый обычный анальгин.
8. Глюкокортикоиды - нужны для купирования аллергической реакции немедленного типа. Вам придется воспользоваться преднизолоном или дексаметазоном. Но обязательно проконсультируйтесь хотя бы в телефонном режиме перед введением таких препаратов, так как есть много противопоказаний.
9. Противопаразитарные средства - таблетки такие как Nexgard spectra, Simparika, Бравекто, капли на холку, к примеру, Stronghold, ошейники.

Медикаментозная помощь животным:

- Для борьбы с шумофобией: силео
- От тревоги: тразодон, габапентин

- Мягкие и медленно или накопительно действующие препараты:
 - Витамины группы В
 - Мелатонин
 - Триптофан
 - Зилкене
 - Анкситан