

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 10 липня 2024 року.

На обстеженій площі озимої пшениці 183 га личинками клопа-черепашки заселено 82 га (45 %) в середній чисельності 0,4 екз. на кв.м. в середньому пошкоджено 2 % рослин в слабкому ступені, хлібними жуками заселено 77 га (42 %) в середній чисельності 1 екз. на кв.м. в середньому пошкоджено 2 % рослин в слабкому ступені. На обстеженій площі озимої пшениці 183 га септоріозом заселено 82 га, в середньому пошкоджено – 1 % рослин з середнім розвитком хвороби 1 %.

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності – 8, максимально – 24 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 7, максимально – 55 % рослин в слабкому ступені на 1182 га від обстежених площ 1709 га. Злаковими блішками в середній чисельності – 5, максимально – 11 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 9, максимально – 24 % рослин кукурудзи в слабкому ступені на 515 га обстежених площ.

В Кропивницькому (Долинський та Олександрівський райони) районі личинками коника зеленого за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 201 га з 501 га обстежених.

З 01 липня відмічено початок яйцекладки стеблового (кукурудзяного) метелика. Яйцекладками шкідника в середньому заселено – 1, максимально – 4 % рослин, 1 кладка на рослину. З 09 липня відмічено відродження гусениць шкідника.

Під час цвітіння на початку відкладання яєць стебловим (кукурудзяним) метеликом, совками випускають трихограму (100-150 тис. особин на га), а в період масового відкладання (через 7-8 днів) випуск трихограми повторюють. Хімічні обробки проти стеблового кукурудзяного метелика будуть ефективні й проти попелиць.

В Кропивницькому (Бобринецький район) та Голованівському (Гайворонський район) районах бульбочковими довгоносиками в середній чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин сої на 120 га обстежених, люцернового клопа середня чисельність - 5 екз. на 100 п.с (40 га).

В Голованівському (Гайворонський район) районі гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,5, екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин сої на 80 га обстежених площ.

В Кропивницькому (Олександрівський район) районі попелицею в середній чисельності – 2, максимально – 3 екз. на рослину в середньому пошкоджено – 2, максимально – 3 % рослин сої на 158 га обстежених площ.

В Кропивницькому (Долинський район) районі павутинним кліщем за середньої чисельності 0,5 екз. на листок в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин сої на 29 га обстежених площ.

В Кропивницькому (Новгородківський район) районі гусеницями лучного метелика в середній чисельності 0,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 %

рослин сої на 20 га з 285 га обстежених.

Аскохітозом уражено 1, максимально – 5 % рослин сої з розвитком хвороби – 1, максимально - 3 % на 325 га з 625 га обстежених. Пероноспорозом уражено – 7, максимально 10 % рослин сої з розвитком хвороби – 6, максимально - 8 % на 121 га з 625 га обстежених. В Кропивницькому (Долинський район) районі альтернаріозом уражено 3 % рослин сої з розвитком хвороби 1 % на 62 га обстежених площ.

При виявленні перших ознак хвороб за бутонізації-цвітіння на насінневих посівах сої рекомендується проводити обробку рослин розчинами дозволених фунгіцидів. Рослини, уражені вірусними хворобами, з посівів видаляють. Під час формування бобів, за надпорогової чисельності шкідників проводять обприскування посівів інсектицидами, згідно з «Державним реєстром пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» в 2024 році. У період відкладання яєць совками, акаціевою вогнівкою випускають трихограму.

Геліхризовою попелицею в середній чисельності – 8, максимально – 25 екз. на рослину в середньому пошкоджено – 5, максимально – 8 % рослин соняшнику на 1021 га з 1684 га обстежених.

В Кропивницькому (Бобринецький район) районі гусеницями совки-гамма в середній чисельності – 0,2, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин соняшнику на 50 га з 177 га обстежених.

В Кропивницькому (Новгородківський та Устинівський райони) районі гусеницями лучного метелика в середній чисельності 0,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин соняшнику на 48 га з 360 га обстежених.

В Кропивницькому (Долинський район) районі павутинним кліщем в середній чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 7 % рослин соняшнику в слабкому ступені (29 га), польовими клопами в середній чисельності – 2, максимально - 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин соняшнику в слабкому ступені (133 га).

В Кропивницькому (Олександрівський район) районі личинками коника зеленого за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 133 га обстежених площ.

Пероноспорозом в середньому уражено – 5, максимально – 7 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 3, максимально – 4 % на 382 га з 1684 га обстежених. Фомозом в середньому уражено – 8, максимально – 12 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 4, максимально – 7 % на 387 га з 1684 га обстежених. В Кропивницькому (Бобринецький район) районі септоріозом в середньому уражено – 30, максимально – 35 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби 15 % на 107 га з 177 га обстежених.

Вогнища фітофагів локалізують дозволеними препаратами. Під час масового відкладання яєць совками, лучним метеликом доцільний випуск трихограми. За умов очікування епіфітотії гнилей кошиків, фомопсису, несправжньої борошнистої роси захищають рослини культури дозволеними до використання фунгіцидами. Першу обробку проводять на початку цвітіння,

другу – через 14 днів після першої.

Личинками колорадського жука за середньої чисельності – 3, максимально – 7 екз. на кущ в середньому заселено і пошкоджено 3 % кущів картоплі, в т.ч. в слабкому ступені – 72, середньому – 21, сильному – 7 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом в середньому уражено – 7, максимально – 11 % рослин картоплі (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 8 %.

Фітофторозом в середньому уражено – 7, максимально – 8 % рослин томатів (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби – 3, максимально – 5 %.

В Кропивницькому (Бобринецький район) районі капустиною попелицею в середній чисельності – 15, максимально – 25 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 35, максимально – 40 % рослин середньої капусти в слабкому ступені, хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 3, максимально – 7 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 27, максимально – 30 % рослин середньої капусти в слабкому ступені, білокрилкою в середній чисельності – 20, максимально – 40 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 90 % рослин середньої капусти в слабкому ступені. В Кропивницькому (Олександрівський район) районі білокрилкою в середній чисельності – 5, максимально – 20 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 7, максимально – 15 % рослин пізньої капусти в слабкому ступені (присадибні ділянки).

Проти листогризух та сисних комах, хвороб слід застосовувати рекомендовані за регламентами технологій препарати. Наступні обробки посівів проводять через 8-10 днів за суворого дотримання „строків очікування” до збирання врожаю.

В Кропивницькому (Бобринецький район) районі в плодівих садах яблуневими попелицями в середній чисельності – 4, максимально – 8 екз. на заселений лист в середньому заселено та пошкоджено – 4, максимально – 5 % листків в середньому на 20 % дерев, яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено – 2, максимально – 4 % плодів в середньому на 30 % дерев на 100 % площ (4 га).

Паршею яблуні в середньому уражено – 6, максимально – 7 % листків з середнім розвитком хвороби 3 % та в середньому уражено 2 % плодів з середнім розвитком хвороби 1 % на 20 % дерев, плодовою гниллю в середньому уражено – 3, максимально – 4 % плодів падалиці під 30 % дерев (4 га).

Плодові насадження за поширення шкідників і хвороб захищають дозволеними препаратами відповідно до розроблених рекомендацій.