

Практический навык (манипуляция):
наложение кровоостанавливающего жгута типа Эсмарха

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: – продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»; – проговорил: <i>«Безопасно»</i>	1	
2.	Принял меры безопасности: – проговорил: <i>«По возможности обработать руки антисептиком»</i> ; – надел маску; – надел перчатки	1	
3.	Наладил контакт с пострадавшим: – представился: <i>проговорил «Меня зовут...»</i> ; – проинформировал о намерении помочь. Проговорил: <i>«Я Вам окаж помощь, наложу кровоостанавливающи жгут Эсмарха»</i> ; – получил согласие на ее выполнение. Проговорил: <i>«Вы согласны?»</i> ; – предложил занять необходимое положение. Проговорил: <i>«Присядьте, пожалуйста»</i> , помог сесть пострадавшему	1	
4.	Придал поврежденной конечности возвышенное положение:	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	– правую руку пострадавшего приподнял и уложил на свое надплечье		
5.	Применил пальцевое прижатие артерии на протяжении: – расположил второй, третий, четвертый пальцы в верхней трети правого плеча в месте определения пульсации плечевой артерии и осуществил прижатие артерии; – попросил помощника или самого пострадавшего повторить данное действие; – проконтролировал правильное его выполнение (сделал замечание в случае неточного выполнения действия)	2	
6.	Выбрал и подготовил место наложения жгута: – проговорил: <i>«При артериальном кровотечении из верхней трети правого предплечья жгут накладывается на нижнюю треть правого плеча. При кровотечении из ран предплечья и плеча жгут накладывается на плечо (кроме его средней трети), при кровотечении из ран голени и бедра - на бедро (кроме его нижней трети), выше места повреждения.»</i>; – обернул циркулярно (полностью) нижнюю треть правого плеча полотенцем или салфеткой, исключая образование складок и неровностей	1	
7.	Подготовил и правильно расположил жгут: – взял жгут двумя руками от края с пуговицами на расстоянии около 15 см между кистями рук, так чтобы пуговицы располагались застежками	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	вверх внутри ладони левой руки (обе ладони в положении пронации); – расположил жгут над нижней третью правого плеча от дистального края салфетки; – растянул жгут двумя руками		
8.	Наложил жгут: – наложил первых два тура с сильным натяжением, а каждый последующий – спиралевидно с уменьшением натяжения в направлении «от дистального конца конечности к проксимальному», туры жгута наложил без свободных промежутков, прикрывая друг друга на 1/3 – 1/2 ширины, не перекрещиваясь; – свободные концы жгута закрепил на застежки; – попросил помощника или самого пострадавшего отпустить пальцевое прижатие артерии; – опустил конечность пострадавшего вниз	2	
9.	Проверил правильность наложения жгута: – проговорил: <i>«Кровотечение остановлено»;</i> – второй, третий (и четвертый) пальцы руки расположил на области лучевой артерии правой руки пострадавшего; – проговорил: <i>«Пульс не определяется»;</i> – проговорил: <i>«Конечность побледнела»</i>	2	
10.	Использовал записку: – на небольшом листе бумаги записал время наложения жгута, указал	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	свою фамилию и инициалы как лица, наложившего жгут; – поместил записку под последний тур жгута		
11.	Провел обезболивание: – проговорил: <i>«По возможности обезболить»</i>	1	
12.	Наложил асептическую повязку на рану в верхней трети правого предплечья: – проговорил: <i>«По возможности обработать кожу вокруг раны антисептиком»</i> ; – наложил асептическую (чистую) салфетку; – наложил циркулярную (6 – 8 туров) бинтовую повязку на область раны в верхней трети правого предплечья	1	
13.	Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на правую руку пострадавшего: – придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу); – подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности; – приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны; – поднял нижний конец косынки, огИБая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны;	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	– связал концы косынки на здоровой стороне; – зафиксировал вершину косынки так, чтобы жгут остался виден; – проконтролировал, что только кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью; – проговорил: <i>«В холодное время года укутать поврежденную конечность»</i>		
14.	Обеспечил транспортировку пострадавшего в положении лежа в организацию здравоохранения: – проговорил: <i>«Вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номерам «101» или «103» или «112»»;</i> – проговорил: <i>«Сообщить информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказанной помощи пострадавшему»;</i> – проговорил: <i>«Необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в организацию здравоохранения в положении лежа»;</i> – проговорил: <i>«Жгут накладывать максимально на 1 час. Детям до 3-х лет жгут не накладывать. При длительной транспортировке каждые 20-30 минут ослаблять жгут на 10-15 минут, используя пальцевое прижатие для остановки кровотечения (повторное наложение жгута необходимо производить выше предыдущего места и указать в записке время послабления)»</i>	1	
	ВСЕГО		