

**EFFECTO DEL KA'A HE'Ê *Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni* EN EL
BALANCEADO CASERO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE POLLOS
PARRILLEROS EN LA COLONIA Dr. DOMINGO MONTARO**

Autor: Sandro Arnulfo Acuña Alderete

Tutor: I.A Luis Alberto Cáceres

RESUMEN

El experimento se realizó en la Colonia Dr. Domingo Montanaro, del distrito de Coronel Oviedo a 27 km del centro urbano, Departamento de Caaguazú . El periodo de la investigación abarco desde el mes enero hasta marzo del año 2018, totalizando así un tiempo efectivo de 4 meses. El objetivo fue evaluar el efecto del ka'a he'ê Stevia rebaudiana Bertoni en el balanceado casero sobre la productividad de pollos parrilleros en la colonia Dr. Domingo Montaro. Las variables evaluadas fueron; el consumo diario de alimentos, la ganancia de peso gramos/día, el rendimiento de la canal, el índice de rentabilidad. La variable independiente estudiada fueron las el efecto del ka'a he'ê Stevia rebaudiana Bertoni en el balanceada casero sobre la productividad de pollos parrilleros. Los tratamientos estuvieron compuesto por T1 (Balanceado casero sin de Stevia), T2 (Balanceado casero con 1% de Stevia), T3 (Balanceado casero con 1,5 % de Stevia) y T4 (Balanceado casero con 2% de Stevia). , T5 (Balanceado comercial). Los resultados obtenidos. En relación a la ganancia diaria de peso entre los tratamientos el T5 arrojó el mejor resultado con un promedio de 117,84 gramos por día, en la ganancia diaria de peso se observó que entre los tratamientos, el T5 arrojó mayor resultado con un promedio de 70,26 gramos por día. Para las variables conversión alimentaria y rendimiento de la canal no presentaron diferencias estadísticas significativas En cuanto al índice de rentabilidad; el T3 fue el tratamiento más rentable.

PALABRAS CLAVE: alimentación, aves, ingredientes alternativos, productividad.