

На виконання наказу Держпродспоживслужби від 17 червня 2016 року № 159 «Про забезпечення виконання основних напрямків державної інформаційної політики у сфері захисту рослин, надання інформації щодо діяльності управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в областях» Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 09 червня 2022 року.

На обстеженій площі озимої пшениці 1397 га клопом-черепашкою заселено 714 га (51 %) в середній чисельності – 0,4, максимально – 2 екз. на кв.м. В середньому пошкоджено – 2, максимально – 10 % рослин в слабкому ступені. Самок в середньому – 55, максимально – 65 %, в т.ч. зрілі – 55 %, з них спорожнених 35 %; дозріваючі – 10 %. Яйцекладками шкідника заселено 642 га озимої пшениці, в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 на кв.м, з них свіжовідкладені – 30, якірні – 65, теленомусні – 5 %. Початок відродження личинок клопа-черепашки відмічено з 03 червня. Середня чисельність личинок шкідника – 0,6, максимально – 2 екз. на кв.м на 75 га озимої пшениці, в середньому пошкоджено – 2 % рослин, в слабкому ступені. Віковий склад: I – 50 %, II – 50 %.

На обстеженій площі озимого ячменю хлібними клопами заселено 50 га в середній чисельності 1 екз. на кв.м, в середньому пошкоджено 2 % рослин в слабкому ступені.

В Олександрівському (Кропивницький) та Світловодському (Олександрійський) районах в посівах озимої пшениці імаго відбувається крайове заселення хлібних жуків в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м на 18 % обстежених площ (255 га).

В посівах озимої пшениці злаковими попелицями в середній чисельності – 5, максимально – 16 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 7, максимально – 12 % рослин в слабкому ступені на 64 % від обстеженої площі 1397 га.

В посівах озимого ячменю злаковими попелицями в середній чисельності – 3, максимально – 5 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 2, максимально – 3 % рослин в слабкому ступені на 33 % від обстеженої площі 341 га.

В посівах озимої пшениці злаковими блішками в середній чисельності – 2, максимально – 8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 3, максимально – 10 % рослин в слабкому ступені на 25 % від обстеженої площі 1397 га. В посівах ячменю шкідником в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин в слабкому ступені на 18 % від обстеженої площі 341 га.

В посівах озимої пшениці личинками хлібних п'явиць заселено 49 % від обстеженої площі 1880 га в середній чисельності – 1, максимально – 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 3, максимально – 10 % рослин в слабкому ступені.

В посівах озимого ячменю личинками хлібних п'явиць заселено 77 % від

обстеженої площі 341 га в середній чисельності – 0,5, максимально – 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 2, максимально – 5 % рослин в слабкому ступені.

В посівах ячменю личинками хлібних п'явиць заселено 100 % від обстеженої площі 80 га в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин в слабкому ступені.

Імаго пшеничного трипса заселено 605 га з обстеженої площі озимої пшениці, в середньому заселено 5 % колосків в середній чисельності – 3 екз. на колос.

В посівах озимого ячменю імаго пшеничного трипса заселено 63 га з обстеженої площі, в середньому заселено 3 % колосків в середній чисельності – 3 екз. на колос.

Борошнистою росю в середньому уражено – 7, максимально – 15 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 3, максимально – 6 % на 414 га з 1397 га обстежених. Бурою іржею в середньому уражено – 6, максимально – 12 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 4, максимально – 10 % на 807 га з 1397 га обстежених. Септоріозом в середньому уражено – 3, максимально – 15 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 2, максимально – 10 % на 780 га з 1397 га обстежених.

Борошнистою росю в середньому уражено 1 % рослин озимого ячменю з середнім розвитком хвороби 1 % на 148 га обстежених. Бурою іржею в середньому уражено 5 % рослин озимого ячменю з середнім розвитком хвороби 1 % на 50 га обстежених. Гельмінтоспоріозом в середньому уражено 7 % рослин озимого ячменю з середнім розвитком хвороби 3 % на 193 га обстежених. Септоріозом уражено 5 % рослин озимого ячменю (50 га) з розвитком хвороби 2 %.

Під час виходу рослин в трубку, за інтенсивності ураження борошнистою росю, бурою листовою іржею, гельмінтоспоріозом, іншими плямистостями 1 %, септоріозом листя 3-5 %, корневими гнилями за достатнього зволоження – обприскують рекомендованими фунгіцидами відповідного спектру дії.

В посівах кукурудзи (575 га) злаковими блішками в середній чисельності – 2, максимально 6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено - 5, максимально - 10 % рослин в слабкому ступені. В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності - 3, максимально - 14 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 4, максимально - 12 % рослин в слабкому ступені на 44 % від обстеженої площі 695 га.

В посівах гороху бульбочковими довгоносиками в середній чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин (75 га), на 100 п.с. в середньому нараховується 40 екз. горохової попелиці та 3 екз. горохової зернівки (195га).

Аскохітозом в середньому уражено 2 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби 1 % на 60 га з 195 га обстежених.

В посівах соняшнику (225 га) піщаним мідляком в середній чисельності 0,9 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин в слабкому ступені. Вогнища фітофагів локалізують дозволеними препаратами.

В Устинівському (Кропивницький) районі в посівах соняшнику сірим довгоносом в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 34 га з 103 га обстежених площ.

В посівах соняшнику буряковою попелицею в середній чисельності 4 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин соняшнику (194 га) в слабкому ступені. Геліхризовою попелицею в середній чисельності 15 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 12 % рослин соняшнику (250 га) в слабкому ступені.

Пероноспорозом в середньому уражено 2 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби 1 % на 237 га з 699 га обстежених.

В Петрівському (Олександрійський) районі фомозом в середньому уражено 2 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби 1 % на 50 га обстежених площ.

Личинками капустяного стручкового комарика (галицею) в середній чисельності 6, максимально - 12 екз. на стручок в середньому заселено і пошкоджено - 4, максимально - 10 % стручків на 8, максимально - 18 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 213 га обстежених площ.

Пероноспорозом в середньому уражено 6 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 3 % на 44 га з 283 га обстежених. Альтернаріозом в середньому уражено 6 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 5 % на 70 га з 341 га обстежених.

Імаго колорадського жука за середньої чисельності - 2,5, максимально - 10 екз. на кущ в середньому заселено і пошкоджено - 27, максимально - 60 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 17 % кущів, личинками в середній чисельності - 6, максимально - 13 екз. на кущ в середньому заселено і пошкоджено - 17, максимально - 60 % кущів картоплі в слабкому ступені - 83 %, середньому - 16, сильному 1% (присадибні ділянки).

В Бобринецькому районі (Кропивницький район) капустяною попелицею в середній чисельності - 10, максимально - 15 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено - 4, максимально - 5 % рослин ранньої капусти в слабкому ступені (присадибні ділянки).

В Бобринецькому районі (Кропивницький район) в плодкових садах яблуневою міллю заселено 10 % дерев в середній чисельності 1 гніздо/дерево в середньому пошкоджено 4 % листків в слабкому ступені - 72, середньому - 22, сильному - 6 %, яблуневою зеленою попелицею заселено 40 % дерев, в середньому заселено та пошкоджено - 4, максимально - 5 % листків в середній чисельності - 6, максимально - 12 екз. на заселений листок (4 га).

З 01 червня відмічено відродження гусениць яблуневої плодожерки пошкоджено 5 % плодів на 50 % дерев (присадибні ділянки).

Паршею яблуні в середньому уражено – 3, максимально – 4 % листків з середнім розвитком хвороби 1 % та в середньому уражено 2 % плодів з середнім розвитком хвороби 1 % на 20 % дерев (4 га).

Плодові насадження за поширення шкідників і хвороб захищають дозволеними препаратами відповідно до розроблених рекомендацій.