

บทที่ 4

ผลการทดลอง

ตอนที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถของถ่านไม้ เปลือกทุเรียน และเปลือกจำปาะในการดูดกลิ่น

ตารางที่ 1 การแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านไม้ เปลือกทุเรียน และเปลือกจำปาะในการ ดูดกลิ่นในตู้เย็น

กำหนดให้

3 = ดีมาก ไม่มีกลิ่น

2 = พอใช้ มีกลิ่นเล็กน้อย

1 = ปรับปรุง ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่

ชนิดของถ่าน		เวลา		เฉลี่ย	หมายเหตุ
	15 นาที	30 นาที	1 ชั่วโมง		
1.ถ่านไม้	2	2	3	2.3	ทดลองในตู้เย็น
2.ถ่านจากเปลือกทุเรียน	2	2	2	2	
3.ถ่านจากเปลือกจำปาะ	2	2	3	2.3	

ชนิดของถ่าน		เวลา		เฉลี่ย	หมายเหตุ
	15 นาที	30 นาที	1 ชั่วโมง		

1.ถ่านไม้	2	2	3	2.3	ทดลองใน ตู้รองเท้า
2.ถ่านจากเปลือก ทุเรียน	2	2	2	2	
3.ถ่านจากเปลือก จำปาอะ	2	2	3	2.3	