

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên học sinh : Lớp :

Mã đề 105

Trả lời:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.					

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (6; 3; -2)$ thì phương trình của (α) là:

- A. $-6x - 3y - 2z = 0$. B. $6x - 3y - 2z = 0$. C. $-6x + 3y - 2z = 0$. D. $6x + 3y - 2z = 0$.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(x_A; y_A; z_A), B(x_B; y_B; z_B)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

- A. $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$. B. $(x_A + x_B; y_A + y_B; z_A + z_B)$.
C. $\left(\frac{x_B - x_A}{2}; \frac{y_B - y_A}{2}; \frac{z_B - z_A}{2} \right)$. D. $\left(\frac{x_A + x_B}{3}; \frac{y_A + y_B}{3}; \frac{z_A + z_B}{3} \right)$.

Câu 3. Khoảng cách từ $M(1;4;-7)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 9 = 0$ là:

- A. 12 . B. $\frac{25}{3}$. C. 7 . D. 5 .

Câu 4. Cho mặt phẳng $(P): 2x - 3z - 1 = 0$. Khi đó (P) có một vector pháp tuyến là:

- A. $\vec{n} = (2; -3; -1)$. B. $\vec{n} = (2; -3; 0)$. C. $\vec{n} = (2; 0; -3)$. D. $\vec{n} = (2; -3; 1)$.

Câu 5. Cho mặt cầu (S): $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 12$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

- A. (S) có tâm $I(-1;2;3)$. B. (S) đi qua điểm $M(1;0;1)$.
C. (S) có bán kính $R = 2\sqrt{3}$. D. (S) đi qua điểm $N(-3;4;2)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ tâm I, bán kính R của mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ là:

A. $I(-1;2;0)$, $R=5$.

B. $I(1;2;0)$, $R=5$.

C. $I(1;-2;0)$, $R=5$.

D. $I(1;-2)$, $R=5$.

Câu 7. Trong không gian Oxyz cho hai vector $\vec{a}=(a_1;a_2;a_3), \vec{b}=(b_1;b_2;b_3)$. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. $\vec{a}+\vec{b}=(b_1-a_1;b_2-a_2;b_3-a_3)$.

B. $\vec{a}-\vec{b}=(a_2-b_2;a_1-b_1;a_3-b_3)$.

C. $\vec{a}.\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$.

D. $k\vec{b}=(ka_1,ka_2,ka_3), k \in R$.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho $\vec{OM}=xi+yj+zk$. Tọa độ của điểm M là:

A. $M(i;j;k)$.

B. $M(xi;yj;zk)$.

C. $M(z;y;x)$.

D. $M(x;y;z)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình của mặt cầu có tâm $I(1;1;1)$, bán kính $R=\sqrt{2}$.

A. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=4$.

B. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$.

C. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=2$.

D. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=2$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho $A(x_A;y_A;z_A), B(x_B;y_B;z_B)$. Công thức nào dưới đây là đúng.

A. $\vec{BA}=(x_A+x_B;y_A+y_B;z_A+z_B)$.

B. $|\vec{AB}|=(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2$.

C. $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.

D. $\vec{AB}=(x_A-x_B;y_A-y_B;z_A-z_B)$.

Câu 11. Trong không gian Oxyz cho hai vector $\vec{a}=(a_1;a_2;a_3), \vec{b}=(b_1;b_2;b_3)$ đều khác vector-không.

Gọi α là góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Câu nào sai trong các câu sau:

A. $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0$.

B. $\cos \alpha = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}$.

C. $\cos \alpha = \frac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{(a_1^2+a_2^2+a_3^2).(b_1^2+b_2^2+b_3^2)}$.

D. $\cos \alpha = \frac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}.\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}}$.

Câu 12. Trong không gian Oxyz, điều kiện để phương trình dạng $x^2+y^2+z^2+2ax+2by+2cz+d=0$ là phương trình của mặt cầu tâm $I(-a;-b;-c)$, bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$ là:

A. $a^2+b^2+c^2-d^2>0$.

B. $a^2+b^2+c^2+d^2>0$.

C. $a^2+b^2+c^2-d>0$.

D. $a^2+b^2+c^2+d>0$.

Câu 13. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(1;1;-2)$ và $B(2;2;1)$. Vector $\vec{AB}$ có tọa độ là:

- A. $(3;3;-1)$. B. $(3;1;1)$. C. $(1;1;3)$. D. $(-1;-1;-3)$.

Câu 14. Giá trị cosin của góc giữa hai vectơ $\vec{a} = (4;3;1)$ và $\vec{b} = (0;2;3)$ là:

- A. $\frac{5\sqrt{26}}{26}$. B. $\frac{5\sqrt{2}}{26}$. C. $\frac{9\sqrt{13}}{26}$. D. $\frac{9\sqrt{2}}{26}$.

Câu 15. Trong không gian Oxyz, chọn câu đúng trong các câu sau:

- A. Mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình $z = 0$.
 B. Mặt phẳng tọa độ (Ozx) có phương trình $x = 0$.
 C. Mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình $x + y = 0$.
 D. Mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình $y + z = 0$.

Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $\vec{a} = (1;-1;3)$, $\vec{b} = (2;0;-1)$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$.

- A. $\vec{u} = (-4;-5;9)$. B. $\vec{u} = (1;3;-11)$. C. $\vec{u} = (4;2;-9)$. D. $\vec{u} = (-4;-2;9)$.

Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 3 = 0$ và điểm $I(1;1;0)$. Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với (P) là:

- A. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = \frac{5}{\sqrt{6}}$. B. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = \frac{25}{6}$.
 C. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = \frac{25}{6}$. D. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = \frac{5}{6}$.

Câu 18. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(-1;2;2)$ và $B(3;0;-1)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm B và vuông góc với đường thẳng AB. Mặt phẳng (P) có phương trình là

- A. $4x - 2y + 3z - 9 = 0$. B. $4x - 2y - 3z - 9 = 0$. C. $4x - 2y - 3z - 15 = 0$. D. $4x + 2y - 3z - 15 = 0$.

Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(8;0;0), B(0;0;-4), C(0;2;0)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

- A. $x + 4y - 2z = 0$. B. $\frac{x}{4} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$. C. $\frac{x}{8} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-4} = 0$. D. $x + 4y - 2z - 8 = 0$.

Câu 20. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P): $2x - y + 3z + 5 = 0$ và (Q): $2x - y + 3z + 1 = 0$ bằng:

- A. $\frac{6}{\sqrt{14}}$. B. $\frac{4}{\sqrt{14}}$. C. 6. D. 4.

Câu 21. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(1;0;0)$, $B(0;0;2)$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 1 = 0$. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng chứa hai điểm A, B và tiếp

xúc với (S) ?

A. 2 .

B. 1 .

C. 0 .

D. 3 .

Câu 22. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;-2;3)$. Gọi (S) là mặt cầu chứa A có tâm I thuộc tia Ox và bán kính bằng 7. Phương trình mặt cầu (S) là

A. $(x+7)^2 + y^2 + z^2 = 49$.

B. $(x-7)^2 + y^2 + z^2 = 49$.

C. $(x-3)^2 + y^2 + z^2 = 49$.

D. $(x+5)^2 + y^2 + z^2 = 49$.

Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 16$ và các điểm $A(1;0;2)$, $B(-1;2;2)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A , B sao cho thiết diện của mặt phẳng (P) với mặt cầu (S) có diện tích nhỏ nhất. Khi viết phương trình (P) dưới dạng $ax + by + cz + 3 = 0$. Tính tổng $T = a + b + c$.

A. -2 .

B. -3 .

C. 3 .

D. 0 .

Câu 24. Trong không gian $Oxyz$ cho $A(1;1;1)$, $B(-1;2;0)$, $C(3;-1;2)$. Điểm $M(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z + 7 = 0$ sao cho $Q = \left| 3\overline{MA} + 5\overline{MB} - 7\overline{MC} \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $T = a + b + c$.

A. 12 .

B. -41 .

C. -9 .

D. 13 .

Câu 25. Hai quả bóng hình cầu có kích thước khác nhau được đặt ở hai góc của một căn nhà hình hộp chữ nhật sao cho mỗi quả bóng đều tiếp xúc với hai bức tường và nền của nhà đó. Biết rằng trên bề mặt của quả bóng đều tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường và nền nhà mà nó tiếp xúc bằng $1; 3; 4$. Tổng độ dài đường kính của hai quả bóng đó bằng.

A. 16 .

B. 14 .

C. 10 .

D. 12 .

----- **HẾT** -----