

Região	Prescrição	Descrever prescrição para não ter erro
COLUNA	COLUNA ROTINA	-
Coluna tumor	COLUNA TUMOR	REALIZAR COLUNA ROTINA + SAGITAL T1 COM FATSAT PRÉ -CONTRASTE + SAGITAL E AXIAL T1 COM FATSAT POS CONTRASTE
Coluna infecção	COLUNA INFECÇÃO	REALIZAR COLUNA ROTINA + SAGITAL T1 COM FATSAT PRÉ -CONTRASTE + SAGITAL E AXIAL T1 COM FATSAT POS CONTRASTE
Coluna fratura	COLUNA ROTINA + SAGITAL STIR	
Coluna cervical em lesão de plexo	COLUNA ROTINA + axial balance volumétrico da cervical	
SACROILÍACAS	SACROILÍACAS INFLAMAÇÃO	No HC: com contraste
JOELHO	JOELHO ROTINA	-
OMBRO	OMBRO ROTINA	-
PUNHO	PUNHO ROTINA	-
MÃO	MÃO ROTINA	-
BACIA	BACIA ROTINA	-
QUADRIL	QUADRIL ROTINA	Se avaliação de impacto: + axial oblíquo
PERNA/BRAÇO/COXA	-	Se avaliação muscular: rotina sem contraste; Se avaliação de lesão: com contraste + sequências adicionais (difusão, ADC, DIXON)
TORNOZELO	TORNOZELO ROTINA	-

PÉ	PE ROTINA	Se dor antepé: Coronal (eixo curto do pé) T1 e T2 sem FS
MAV		Plano T1 que melhor identifica a lesão + 3 planos T2FS + axial T1FS pré >> injetar contraste<< angioRM dinâmica + pós contraste rotina 3 planos T1FS
PLEXO BRAQUIAL	PLEXO ROTINA	Se desfiladeiro torácico: protocolo desfiladeiro (com contraste e sequência com membros elevados) Se doença inflamatória sequência pré e pós contraste
Detalhes	Articulações em geral no HC: 1plano fracture + 1 plano T1 + 3 planos T2FS Contraste em contexto de lesões neoplásicas, infecções e inflamações: importante sequência T1FS pré e pós contraste. Avaliação de nervo: importante axial T1 puro	

PLANOS PREFERENCIAIS

OMBRO:axial |

COTOVELO:sagital |

PUNHO:coronal |

MAO:coronal |

QUADRIL:coronal |

JOELHO:sagital |

TORNOZELO:sagital |

PÉ:axial |

OSTENECROSE QUADRIL

QUADRIL ROTINA + CORONAL T1 SPIR PRÉ-CONTRASTE + CORONAL T1 SPIR PÓS-CONTRASTE + AXIAL T1 SPIR PÓS-CONTRASTE + SAGITAL T1 SPIR PÓS-CONTRASTE

OSTEOMIELITE TORNOZELO

TORNOZELO INFECÇÃO REALIZAR ROTINA + AXIAL T1 FS PRÉ-CONTRASTE + AXIAL T1 FS PÓS-CONTRASTE + SAGITAL T1 FS PÓS-CONTRASTE + CORONAL T1 FS PÓS-CONTRASTE + DIFUSÃO (B50, 400, 800)-

OSTEOMIELITE PE

Pé INFECÇÃO REALIZAR Pé ROTINA + CORONAL (EIXO CURTO) T1 FS PRÉ-CONTRASTE + CORONAL (EIXO CURTO) T1 FS PÓS-CONTRASTE + AXIAL (EIXO LONGO) T1 FS PÓS-CONTRASTE + SAGITAL T1 FS PÓS-CONTRASTE + DIFUSÃO (B50, 400, 800)-

OSTEONECROSE COLUNA

COLUNA ROTINA + ESTENDER O FOV PARA INCLUIR TODA A LESÃO E REGIÃO ACOMETIDA, CASO NECESSÁRIO + AXIAL T2 + SAGITAL T1 + SAGITAL T2 + CORONAL T2 + AXIAL T1 FS PRÉ-CONTRASTE + AXIAL T1 FS PÓS-CONTRASTE + SAGITAL T1 FS PÓS-CONTRASTE + AQUISIÇÃO DAS IMAGENS EM BLOCO

Síndrome do piriforme

RM BACIA NESSE CASO INCLUIR ATÉ TERÇO MÉDIO DA COXA PARA AVALIAR CIÁTICO

NAS SEQUÊNCIAS T2 FAT SAT AXIAL E SAGITAL ALTERAR TE (TEMPO DE ECO) PARA 60-70 MS.

FAZER SEQUÊNCIA 3D VOLUMÉTRICA PODERADA EM T1 ADQUIRIDA NO PLANO AXIAL INCLUINDO PEQUENA BACIA E ATÉ TERÇO MÉDIO DA COXA

