

## Lupus da Erythematosus

### CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

#### IATROGENIC (THUỐC)

- AMIODARONE
- TIÊU ĐIỂM - hydrochlorothiazide, thuốc lợi tiểu quai
- KHÁNG SINH — tetracycline
- NSAIDS
- ANTINEOPLASTIC — methotrexate, vincristine,

5-fluorouracil

IDIOPATHIC — bùng phát ánh sáng đa hình, ngứa, viêm da hoạt tính, mày đay do năng lượng mặt trời, mãn tính

viêm da nhạy cảm ánh sáng

KHÁC — viêm da do ảnh hưởng, viêm da do phytocontact (cần tây, mùi tây, chanh, chanh, cỏ thi), rối loạn chuyển hóa porphyrin, xeroderma pigmentosum

### ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

#### QUẢN LÝ CUTANEOUS CỦA SLE

- MALAR RASH— “phát ban do bờ” lên đến 50%

bệnh nhân lupus. Ban đỏ phân bố ác tính trên má và sống mũi

giúp loại bỏ các nếp gấp ở mũi, đặc biệt là sau tia cực tím

Phơi bày

- CHỮA BỆNH Lupus — lên đến 50% bệnh nhân lupus.

Các mảng ban đỏ, rời rạc, có vảy với nang lông cắm trên mặt, cổ và da đầu, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với tia cực tím. Có thể dẫn đến sẹo trung tâm, teo da, giãn da từ xa và phì đại /

giảm sắc tố

- LƯU ĐIỂM CẮT BỎ LỖI - lên đến 10% bệnh lupus

người bệnh. Các nốt sần sùi, hơi có vảy phát triển thành dạng sần hoặc hình khuyên tổn thương trên vai, cánh tay, cổ và thân trên. Thường không có nang trứng, tăng sừng, teo da, thay đổi sắc tố, và sẹo

- HOÀN TIỀN LUPUS — crm, nốt sung tẩy da đầu, mặt, cánh tay, ngực, lưng, đùi và mông

- LUPUS TUMIDUS — u nhú vi-ô-lông mãn tính và mảng hoặc nốt tổn thương trên các khu vực tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

- BULLOUS LESIONS — độ nhạy sáng

- LIVEDO RETICULARIS — xem CÁC QUYỀN LỢI CỤ THỂ

- MÓNG TAY - lên đến 25% bệnh nhân lupus.

Các thay đổi bao gồm rỗ, rỗ, loạn thần kinh

và lunula (màu đỏ của nửa vàng trắng), quanh năm  
ban đỏ

- CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH VIÊN MUCOUS
- LUPUS ALOPECIA

## QUYỀN LỢI CỤ THỂ

### VIỄN THÔNG MẶT TRỜI TRUNG TÂM HOẶC

ERYTHEMA — các nguyên nhân phổ biến bao gồm bệnh rosacea,  
viêm da cơ, SLE, viêm da (tiết bã nhờn,  
dị ứng, tiếp xúc), da do glucocorticoid gây ra  
teo, ống lót

VIỄN THÔNG — nguyên nhân phổ biến bao gồm

tác hại của ánh nắng mặt trời, lão hóa, tăng huyết áp, nghiện rượu,  
bệnh tiểu đường, bệnh trứng cá đỏ, bệnh amyloidosis, bệnh lupus, các bệnh thấp  
khớp khác và chứng telangiectasia mất điều hòa

### LIVEDO RETICULARIS

- NGUYÊN NHÂN - mạch máu (viêm đa mạch, SLE, bệnh sống  
viêm mạch, chứng cryoglobulin máu, kháng phospholipid  
hội chứng kháng thể, xơ vữa động mạch, giang mai,  
TB), tăng độ nhót (đa hồng cầu, tăng tiểu cầu, bệnh macroglobulin máu), bẩm sinh,  
bệnh mạch máu não (hội chứng Sneddon), vô căn
- ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG — hơi đỏ tím, hình lưới

các mảng trên cánh tay, chân và thân, đặc biệt là trong môi trường lạnh. Có thể tiến triển thành

tắc mạch máu với thiếu máu cục bộ và mô

nhồi máu (viêm mạch máu sống với bộ ba ban xuất huyết, nốt sần trên da và đau đớn

vết loét)

Xem thêm về văn bản nguồn này [Nhập văn bản nguồn](#) để có thông tin dịch thuật bổ sung

Gửi phản hồi

Bảng điều khiển bên