

Потрібно внести зміни в каталог **ВИКЛЮЧНО** в сторінки з гібридами кукурудзи та соняшнику, а також всі ці сторінки потрібно переверстати на розмір 208x220 мм та внести правки відповідно до пдф з коментарям.

Ось ці сторінки:

Сторінка з гідридом кукурудзи

**PIONEER**  
P8521

Ранньостиглість, продуктивність, стійкість до стеблового полягання

високий урожай висока вологовіддача висока толерантність до хвороб

ФАО 220

**ПЕРЕВАГИ**

- Простий гібрид із зубоподібним типом зерна
- Добра толерантність до гелмінтоспориозу
- Добра стійкість до стеблового полягання

**РЕКОМЕНДАЦІЇ**

- Придатний до вирощування у монокультурі
- Післяжодові гербіциди застосовувати лише відповідно до фаз розвитку культури

**РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ**

Найбільш ефективна  
Підходить  
Можливе при достатній увазі  
Не рекомендується

12 РАНЬНОСТИГЛІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ

Мінімальний обробіток ✓

Плане збирання ✓

Віддача вологи ■ ■ ■ □

Придатність до монокультури ■ ■ ■ □

Посухоустійкість ■ ■ ■ □

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ**

достатнє зволоження  
**75-80** тисяч рослин/га

недостатнє зволоження  
**65-70** тисяч рослин/га

**ПРИДАТНІСТЬ ДО СТРОКІВ ПОСІВУ**

ранні  
оптимальні  
пізні

Сторінка з гідридом соняшнику

**PIONEER**  
P63LL156

Ранній, адаптивний та стійкий до хвороб

раннє дозрівання високий урожай стійкість до вовчка S рас (A-E) + Sys II

Ранньостиглий простий гібрид

**ВЛАСТИВОСТІ**

Висота рослин – нижче середньої

- Адаптивність до умов вирощування
- Независимість до ґрунтових умов

**РЕКОМЕНДАЦІЇ**

- Для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, на полях з помірним поширенням вовчка соняшникавого раси G
- Уникати посіву на полях, значно уражених склеротинією або іржею, або ж використовувати ефективний фунгіцидний захист

**РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ**

Найбільш ефективна  
Підходить  
Можливе при достатній увазі  
Не рекомендується

54 ТРАДИЦІЙНІ ЛІНОЛЕВІ ГІБРИДИ

**ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:**

фомоспорозу ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

білої гнилі кошика ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

білої гнилі стебла ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

вертицильозу ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

в'янення прилистків ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

пероноспорозу (HBR) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

**РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ**

достатнє зволоження  
**50-55** тисяч рослин/га

недостатнє зволоження  
**45-50** тисяч рослин/га

посухоустійкість 7/9

олійність 7/9

за лінком ПДФ з коментарями до сторінок:

<https://fex.net/uk/s/fyasdp0>

зібрали матеріали і розписали, де які файли, у файл каталогу додали нову таблицю, але не переносили гібриди з брошури, бо їх все одно треба переносити на інший формат, тому потрібно нову структуру зробити відповідно до пдфки з коментарями.

за лінком необхідні матеріали:

<https://we.tl/t-XxIKbk7xXN>

catalog\_2025 – треба переверстати на розмір 208x220 мм (деякі гібриди видаляються, дивитися відповідно до правок у пдфці)

pioneer\_catalog\_208x220 – для прикладу, як з квадрату переформатовували у розмір 208x220 мм, можна брати за основу, відступи, поля лишаються

povynku\_2025 – новинки, які треба додати до каталогу, відповідно до правок

Всі сторінки з гібридами потрібно змінити до **6 вересня!** Але сторінки з гібридами кукурудзи потрібно надіслати в пдф відразу по готовності, щоб паралельно їх можна було перевірити та узгодити.

По завершенню роботи потрібно передати всі робочі матеріали в такому ж формат, що й було надано до цього з усіма лінками й т.д

Цей проект не можна розміщувати на будь - яких ресурсах, як портфоліо робіт!