

Опросник PFDI - 20

Пожалуйста, ответьте на все вопросы в таблице. Отвечая на вопросы, учитывайте ваши симптомы за последние 3 месяца. Если ваш ответ на вопрос "да", то необходимо оценить насколько часто этот симптом вас беспокоит.

Симптомы пролапса тазовых органов (POPDI - 6)

Давление в нижней части живота

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Тяжесть в области малого таза

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Выпячивание или ощущение инородного тела во влагалище

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Необходимость вправления выпячивания во влагалище, чтобы опорожнить кишечник

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Необходимость вправления выпячивания, чтобы опорожнить мочевой пузырь

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Колоректально - анальные симптомы (CRAD - 8)

Необходимость сильного напряжения, чтобы опорожнить кишечник

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Неполное опорожнение кишечника при дефекации

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Потеря кала вне вашего контроля, если стул сформирован правильно

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Потеря кала вне вашего контроля, если стул мягкий

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Отхождение газа из прямой кишки вне вашего контроля

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Боль при дефекации

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Симптомы необходимости срочного опорожнения кишечника

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Выпячивание из влагалища появляется во время или после дефекации

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Симптомы недержания мочи (UDI - 6)

Частое мочеиспускание (> 8 раз днем, > 1 раза ночью)

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Потеря мочи, связанная с ощущением необходимости срочного мочеиспускания

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Потеря мочи, связанная с кашлем, чиханием или смехом

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Потеря небольшого количества мочи (капли) не связана с физическим напряжением

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Трудности при опорожнении мочевого пузыря

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда

Боль или дискомфорт внизу живота или области половых органов при мочеиспускании

нет (симптомы отсутствуют)

нет, но испытывали ранее

иногда

часто

всегда