

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 23 по 29 червня 2023 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь –воскова стиглість, збирання. Соняшник – початок цвітіння. Кукурудза – листоутворення, викидання волоті. Картопля – цвітіння. Соя – бутонізація, цвітіння. Сад – ріст плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці оливковою пліснявою злаків уражено 5 % колосків з розвитком хвороби 3 % на 25 % обстежених площ (481 га).

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 8 % рослин на 56 % обстежених площ, злаковими блішками в середній чисельності 4 екз. на кв.м пошкоджено 7 % рослин на 65 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 52 % обстежених площ, яйцекладками стеблового метелика в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 3 % рослин на 33 % обстежених площ, гусеницями стеблового метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин на 26 % обстежених площ (1142 га).

В посівах соняшнику буряковою попелицею в середній чисельності 7 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 9 % рослин на 21 % обстежених площ, геліхризною попелицею в середній чисельності 13 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 5% рослин на 45 % обстежених площ, клопами сліпняками за середньої чисельності 10 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 9 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 28 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин на 24 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 1 % обстежених площ, яйцекладкою соняшникової вогнівки за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 16 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 40 % обстежених площ, фомозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 48 % обстежених площ, септоріозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 6 % на 7 % обстежених площ, іржею уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 7 % обстежених площ, білою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма – 45 %, стеблова форма – 55 %) на 16 % обстежених площ (1835 га).

В посівах цукрових буряків буряковою попелицею в середній чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ.

В посівах сої бульбочковими довгоносіками в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 50 % обстежених площ,

люцерновим клопом в середній чисельності 0,6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 50 % обстежених площ. Септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 50 % обстежених площ, аскохітозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 32 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 18 % обстежених площ (216 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 1,1 екз. на кущ заселено і пошкоджено 3 % кущів картоплі, личинками в середній чисельності 3 екз. на кущ заселено і пошкоджено 4 % кущів картоплі. Фітофторозом уражено 6 % рослин картоплі з розвитком хвороби 4 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 3 % рослин томатів з розвитком хвороби 1 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у середній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 12 екз. на заселену рослину пошкоджено 30 % рослин, капустяною білокрилкою в середній чисельності 30 екз. на заселену рослину пошкоджено 100 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину пошкоджено 20 % рослин, гусеницями капустяної соки в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину пошкоджено 3 % рослин.

На присадибних ділянках у пізній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 10 екз. на заселену рослину пошкоджено 40 % рослин.

В плодових садах яблуневою попелицею в середній чисельності 5 екз. на лист пошкоджено 5 % листків в середньому на 30 % дерев на 100 % площ, яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 4 % плодів в середньому на 30 % дерев на 80% площ. Паршею яблуні уражено 7 % листків з розвитком хвороби 4 % та 3 % плодів з розвитком хвороби 1 % на 20 % дерев на 100 % площ, плодовою гниллю в середньому уражено 4 % плодів падалиці під 40 % дерев на 80 % обстеженої площі (5 га).