

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 23 по 29 червня 2023 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – молочно-воскова стиглість. Соняшник – листоутворення- початок бутонізації. Кукурудза – листоутворення. Горох – дозрівання. Картопля – цвітіння. Соя – листоутворення. Сад – ріст плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці хлібними клопами за середньої чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 16 % обстежених площ, личинками хлібних клопів за середньої чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 36 % обстежених площ, гусеницями зернової совки за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 25 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 7 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 9 % рослин на 72 % обстежених площ, личинками хлібної п'явиці за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 1 % рослин на 18 % обстежених площ, імаго злакових трипсів в середній чисельності 5 екз. на колос заселено та пошкоджено 8 % рослин на 41 % обстежених, личинками злакових трипсів в середній чисельності 5 екз. на колос заселено та пошкоджено 6 % рослин на 22 % обстежених, імаго хлібних жуків в середній чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 55 % обстежених площ, імаго хлібної жужелиці в середній чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 19 % обстежених площ, середня чисельність хлібного пильщика 1 екз. на 100 п.с. (1878 га).

В посівах озимого ячменю злаковими попелицями за середньої чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 5 % рослин на 35 % обстежених площ, злаковими трипсами в середній чисельності 2 екз. на колос заселено та пошкоджено 5 % рослин на 34 % обстежених, імаго хлібних жуків в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин заселено 23 % обстежених площ, личинками коника зеленого за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 35 % обстежених площ (446 га).

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 4 % рослин на 100 % обстежених площ, злаковими блішками в середній чисельності 4 екз. на кв.м пошкоджено 7 % рослин на 58 % обстежених площ, гусеницями озимої совки за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 13 % рослин на 13 % обстежених площ, личинками коника зеленого за середньої чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 30 % обстежених площ (921 га).

В посівах гороху попелицею за середньої чисельності 105 екз. на 100 п.с. в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин на 27 % обстежених площ.

Аскохітозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 55 % обстежених площ (374 га).

В посівах соняшнику буряковою попелицею в середній чисельності 6 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 6 % рослин на 21 % обстежених площ, геліхризною попелицею в середній чисельності 5 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 27 % обстежених площ, ягідними клопами за середньої чисельності

3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 3 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма за середньої чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 18 % обстежених площ, гусеницями озимої совки за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 9 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика за середньої чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 18 % обстежених площ, личинками коника зеленого за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 12 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 33 % обстежених площ, фомозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 21 % обстежених площ, септоріозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 15 % обстежених площ (1656 га).

В посівах сої бульбичковими довгоносіками в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 61 % обстежених площ, люцерновим клопом в середній чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 31 % обстежених площ, попелицею в середній чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 11 % обстежених площ. Септоріозом уражено 10 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 8 % обстежених площ (425 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 1,1 екз. на кущ заселено і пошкоджено 2 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 5 % кущів, личинками в середній чисельності 3 екз. на кущ заселено і пошкоджено 5 % кущів картоплі. Фітофторозом уражено 4 % рослин картоплі з розвитком хвороби 2 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у ранній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 10 екз. на заселену рослину пошкоджено 20 % рослин, білокрилкою в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину пошкоджено 80 % рослин.

В плодових садах яблуневою попелицею в середній чисельності 6 екз. на лист пошкоджено 3 % листків в середньому на 18 % дерев на 83 % площ, яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 2 % плодів в середньому на 14 % дерев. Паршею яблуні уражено 5 % листків з розвитком хвороби 3 % та 2 % плодів з розвитком хвороби 1 % на 30 % дерев на 67 % площ, борошнистою росою уражено 4 % листків з розвитком хвороби 2 % на 10 % дерев на 17 % площ (6 га).