


## الشغيل والطاقة الحركية

Travail et énergie cinétique [Www.AdrarPhysic.Com](http://Www.AdrarPhysic.Com)




### نشاط 1: مفهوم الطاقة الحركية

- نطلق نفس الكريمة من ارتفاعات مختلفة على عجین فنحصل على النتائج التالية: ( الشكل أ )
- نحرر من نفس الارتفاع ثلاث كريات مختلفة الكتل فنحصل على النتائج التالية: ( الشكل ب )

1. كيف تتغير قيمة السرعة التي تأخذها الكريمة مباشرة قبل اصطدام قطعة العجین مع ارتفاع سقوط الكريمة
2. قارن بين قيمة سرعة الكريمة مباشرة قبل الاصطدام ودرجة تشوه العجین.
3. قارن بين كتلة الكريمة ودرجة تشوه العجین.
4. ما سبب تشويه قطع العجین

5. حسب النتائج السابقة لماذا ترتبط الطاقة المكتسبة من قبل الكريمة؟


لمعرفة تعبير هذه الطاقة نقوم بالتجربة التالية:



$(v^2/m^2/s^2)$	$(v/ms^{-1})$	$(h/m)$
1,40	0.1	
1,98	0.2	
2,80	0.4	
3,43	0.6	
3,96	0.8	
4,42	1.0	
4,46	1.1	
4,85	1.2	


- يكون التركيب التجاري من عارضة صلبة مدرجة ومثبتة راسيا ، كهرمغنتيس ودراته الكهربائية مزودة بقاطع تيار ، كريمة فولاذية ، لاقط يمكن من قياس سرعة الكريمة وقيمت رقمي
- نحرر كريمة فولاذية لتسقط سقط سقطارسيا (بدون سرعة بدئية). ونحسب سرعتها عند مختلف قيم  $h$ .
- 6. أملا الجدول، ثم مثل المنحنى  $.(v^2 = f(h))$ .
- 7. حدد قيمة المعامل الموجي  $k$  ووحدته، ثم قارنه مع  $.g = 9.8N.Kg^{-1}$ .
- 8. أعط تعبير الشغل  $\vec{W}(P)$  بدلالة  $g$  و  $h$  ،
- 9. أكتب تعبير الشغل  $\vec{W}(P)$  من جديد بدلالة  $g$  و  $v$  ، ماذا تستنتج؟

### ✿ صيغ عزوم القصور لبعض الأجسام المتجانسة



### نشاط تجاري 2 : مبرهنة الطاقة الحركية

تطبق على حامل ذاتي قوة ثابتة فوق منضدة هوائية ، ونسجل مواضع مركز قصورة G خلال مدد زمنية متساوية  $T=60ms$  (التسجيل بالسلم الحقيقي).




1. أجرد القوى المطبقة على الجسم 5
2. أحسب أشغال القوى المطبقة على الحامل الذاتي بين الموضعين  $M_2$  و  $M_6$ , ثم أحسب المجموع الجبري لهذه الأشغال  $\sum_{2 \rightarrow M_6} W$
3. أحسب الطاقة الحركية للحامل الذاتي في الموضعين  $M_2$  و  $M_6$
4. قارن بين  $\Delta E_C = E_{C_6} - E_{C_2}$  و  $\sum_{M_2 \rightarrow M_6} W$  ، ماذا تستنتج؟

تمرين تطبيقي 1:

نزيج نحو الأعلى بواسطه حبل جسم صلب  $S$  كتلته  $m = 50 \text{ Kg}$  فوق سطح مائل بزاوية  $\alpha = 60^\circ$  بالنسبة للمستوى الأفقي . تعتبر تأثير الحبل على الجسم ( $S$ ) ثابتا خلال إنتقاله والإحتكاكات مهملا . نأخذ  $g = 10 \text{ N. kg}^{-1}$

1. ينتقل الجسم ( $S$ ) بدون سرعة بدينية من النقطة A ليصل الى النقطة B بطاقة حرکية  $E_{CB} = 400 \text{ J}$  ، احسب تغير الطاقة الحرکية ل ( $S$ ) بين الموضعين A و B .
2. أحسب شغل وزن الجسم ( $S$ ) عند إنتقاله من A الى B نعطي :  $AB = 6 \text{ m}$
3. بتطبيق مبرهنة الطاقة الحرکية ، أوجد قيمة شغل توتر الحبل خلال الإنتقال AB واستنتج توتره  $T$



تمرين تطبيقي 2: تتكون المجموعة من

جسم صلب ( $S$ ) كتلته  $m = 0,8 \text{ Kg}$  قابل لإزلاق فوق مستوى مائل بزاوية  $\alpha = 30^\circ$  بالنسبة للمستوى الأفقي بكرة متجانسة شعاعها  $r = 10 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$  قابلة للدوران بدون إحتكاك حول محوراها الثابت وعزم قصورها  $I = 10^{-2} \text{ Kg.m}^2$

•

•

$\Delta J$

خط غير مدور كتلته مهملة ، ملفوف على مجرى البكرة وثبت طرفه الحر بالجسم ( $S$ ) يمثل المنحنى الممثل في الشكل 2 تغيرات السرعة الزاوية للبكرة بدلالة الزمن

•

•

1. حدد الطاقة الحرکية للبكرة عند التاريخ  $t_1 = 1 \text{ s}$

2. بين التارixin  $t_0$  و  $t_1$  أجزت البكرة  $3,19 \text{ trs}$  ( دور ) بتطبيق مبرهنة الطاقة الحرکية حدد  $T$  توتر الخط

3. حدد المسافة  $d$  التي قطعها الجسم ( $S$ ) بين التارixin  $t_0$  و  $t_1$

4. حدد طبيعة التماس بين الجسم ( $S$ ) والمستوى المائل . نأخذ  $g = 10 \text{ N. kg}^{-1}$