

Topik:

No.	Author (Year)	Study Design & Sample Size	Intervention 1 and Control/ Intervention 2	Outcomes	Results	Short Results
1 C O N T R O L H	Salvatore, et al. (2025)	RCT Intervention group (50), Control (50)	- Pembrolizumab IV 600 mg, 2 weeks - Placebo	- Hemorrhage - Days Survival - Mortality - Platelet count	- Insiden perdarahan (hemorrhage) menunjukkan perbedaan bermakna antara kedua kelompok. Hanya 8% pasien pada kelompok pembrolizumab yang mengalami perdarahan sedang hingga berat dibandingkan 20% pada kelompok plasebo ($p = 0.04$). - Kurva Kaplan–Meier menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kelompok (HR 0.68; 95% CI 0.45–0.95; $p = 0.02$), menandakan bahwa pemberian pembrolizumab secara bermakna memperpanjang waktu bertahan hidup pasien dibandingkan dengan plasebo. - Tingkat mortalitas pada akhir masa observasi (hari ke-120) juga lebih rendah pada kelompok pembrolizumab. Sebanyak 18 pasien (36%) pada kelompok intervensi dilaporkan meninggal dunia, dibandingkan dengan 28 pasien (56%) pada kelompok kontrol ($p = 0.03$). - Perbedaan rata-rata kenaikan jumlah trombosit antar kelompok sebesar $45 \times 10^9/L$ (95% CI 20–70; $p = 0.001$), menunjukkan bahwa	- Hemorrhage↓ - Days Survival↑ - Mortality↓ - Platelet count↑

					pembrolizumab berpotensi memperbaiki fungsi hematopoietik.	
2						
3						
4						