

Эндовенозная лазерная абляция варикозно измененных вен

Любое хирургическое вмешательство сопряжено с риском возникновения тромбоэмболических осложнений. Данный риск повышается при выполнении сосудистых операций, в том числе на венозной системе. Это связано с патологическим влиянием хирургической травмы на состояние свертывающей системы, которая активизируется каскадным механизмом.

Риск тромбоэмболических осложнений напрямую зависит от объема хирургического вмешательства и длительности его выполнения, а также возраста больного, наличия сопутствующей патологии и состояния свертывающей системы крови. Чем выше степень хронической венозной недостаточности, тем выше риск тромботических осложнений.

ОСЛОЖНЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕДУРОЙ

- 1.Образование подкожной гематомы. Подкожная гематома-не требует дополнительного лечения. Возможно симптоматическое лечение.
- 2.Экхимозы (мелкие кровоподтеки) -не требует дополнительного лечения. Связаны с повреждением стенки вены световодом при продвижении в непосредственном контакте со стенкой.
- 3.Фрагментарный тромбофлебит — возможно применение нестероидных противовоспалительных препаратов местно симптоматическое лечение.
- 4.В случае отрыва фрагментов тромбов и их миграция по сосудистому руслу — проводится госпитализация в отделение сосудистой хирургии в экстренном порядке по жизненным показаниям
- 5.Преходящие парестезии по ходу склерозируемой вены -самостоятельно регрессируют в течении 3 месяцев.
- 6.В течение нескольких дней, а иногда и недель после операции может отмечаться повышение температуры тела до 37-37,5 градусов. Это происходит из-за воспалительной реакции в просвете вены. Это состояние не требует специального лечения и обычно не сказывается на общем самочувствии.
- 7.В зависимости от тяжести варикозной болезни оперированная нога может болеть и отекает на протяжении нескольких недель или месяцев. Усиление болей и отека может провоцироваться чрезмерной физической нагрузкой, травмой, приемом больших количеств жидкости, изменением погодных условий и другими причинами.

Противопоказания:

- 1)общее инфекционное заболевание (бактериальный эндокардит, сепсис и т.п.).
- 2) патологическая кровоточивость (как ввиду ряда заболеваний, так и в результате действия медикаментозных препаратов)
- 3) облитерирующий атеросклероз, эндартериит нижних конечностей 3-4 ст.
- 5) общее тяжелое состояние пациента
- 6) индивидуальная непереносимость медицинских препаратов
- 7) остеомиелит
- 8) невозможность длительного нахождения в вертикальном положении
- 9) психические заболевания
- 10) тромбоз глубоких вен нижних конечностей