

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 08 по 14 серпня 2025 року.

Кукурудза –молочна, молочна-воскова стиглість. Соя – утворення бобів. Соняшник – цвітіння, кінець цвітіння. Картопля – в'янення бадилля. Яблуня – ріст та налив плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин на 4 % обстежених площ, гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 12 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 38 % рослин на 98 % обстежених площ, польовими клопами за середньої чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 3 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на качанах – 48, на стеблах – 46, на волоті – 6 %) на 12 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на качанах 30 %, на стебло 70 %) на 2 % обстежених площ (3849 га).

В посівах сої гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 40 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 10 % обстежених площ, антракнозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 60 % обстежених площ, септоріозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 17 % обстежених площ (116 га).

В посівах соняшнику гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 25 % рослин на 100 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин на 38 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 16 % рослин на 29 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 7 % рослин на 38 % обстежених площ, геліхризною попелицею в середній чисельності 8 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 9 % рослин на 51 % обстеженої площі, польовими клопами за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 29 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 7 % на 40 % обстежених площ, септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 12 % обстежених площ, фомозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 75 % обстежених площ, іржею уражено 70 % рослин з розвитком хвороби 10 % на 1 % обстежених площ, бурю іржею кошиків уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 1 % обстежених площ, білою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма - 38 %, стеблова

форма - 15 %, кошик – 47 %) з розвитком хвороби 1 % на 42 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма - 33 %, кошик - 67 %) з розвитком хвороби 1 % на 8 % обстежених площ (1829 га).

В посівах томатів гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 10 % рослин на 100 % обстежених площ. Верхівковою гниллю уражено 20 % рослин з розвитком хвороби 10 % на 100 % обстежених площ (5 га).

В посівах перцю гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ (2 га).

Личинками колорадського жука в середній чисельності 2 шт. на рослину томатів в середньому заселено 3 % рослин, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин. Фітофторозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 %, верхівковою гниллю уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 2 % (присадибні ділянки).

Антракнозом уражено 3 % листків на 4 % рослин огірків з розвитком хвороби 2 %, бактеріозом уражено 5 % листя на 7 % рослин з розвитком хвороби 2 % (присадибні ділянки).

В яблуневому саду паршею уражено 7 % листків з розвитком хвороби 4 % та 2 % плодів з розвитком хвороби 2 % на 20 % дерев на 100 % обстеженої площі (1 га).

З метою моніторингу фітосанітарного стану на виявлення саранових щоденно проводяться обстеження: в посівах кукурудзи нараховуються коники за середньої чисельності – 0,5 екз. на кв.м за на 1 % від обстежених площ 13440 га. На неорних землях середня чисельність саранових (коники, кобилки) – 2, максимально – 6 екз. на кв.м на 22 % від обстежених площ 269 га. На обстежених площах соняшнику (9352 га), сої (1062 га), багаторічних трав (60 га), багаторічних насаджень (88 га) саранових не виявлено.