



เอกสารคุณภาพ ประเภทเอกสารระเบียบปฏิบัติ

เรื่อง การรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก (Banding hemorrhoid)

เอกสารเลขที่ WI / NUR / OPD / 20 ฉบับที่ 3 แก้ไขครั้งที่ 02

วันที่บังคับใช้ 7 / ก.พ. / 65

ผู้ทบทวน	นางนพวรรณ อุป คำ หัวหน้ากลุ่มงาน หรือ ประธานคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการ รพ.	
ผู้ถือครอง	WI ฉบับนี้แจกให้หน่วยงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกทุกแผนกใช้ร่วมกัน

บันทึกการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข

สารบัญ

ตอนที่

หัวข้อ

1

วัตถุประสงค์

2

ขอบเขต

3

นโยบาย

4

ผู้รับผิดชอบ

5

คำนิยาม

6

ขั้นตอนการปฏิบัติ

7

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

8

เครื่องมือใช้วัด

9

แบบตรวจสอบ

วิธีการปฏิบัติ (Work Instruction) โรงพยาบาลจอมทอง	
วิธีการปฏิบัติเลขที่ : WI / NUR / OPD / 20	หน้า 4 จาก 6
เรื่อง : การรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก (Banding hemorrhoid)	

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีทักษะและความชำนาญในการช่วยเหลือแพทย์ทำหัตถการรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก

2. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยนอก เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันในการรัดหัวริดสีดวงทวารหนักเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน

3. นโยบาย

เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความชำนาญในการช่วยเหลือแพทย์ทำการรัดหัวริดสีดวงทวารหนักสามารถทำหัตถการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการปลอดภัย

4. ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยนอก แผนกศัลยกรรมทั่วไป

5. คำจำกัดความ

การรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก(Banding hemorrhoid) เป็นหัตถการที่ใช้ยางรัดบริเวณฐานของก้อนริดสีดวงทวาร ทำให้ไม่สามารถมีเลือดไปเลี้ยงที่ก้อนริดสีดวงได้ ทำให้ก้อนริดสีดวงทวารจะมีขนาดเล็กลงและฝ่อ การรณนั้นการช่วยเหลือแพทย์ทำหัตถการรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก เจ้าหน้าที่ต้องมีทักษะและความชำนาญ เพื่อให้สามารถทำหัตถการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

กรณีการรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก

1. เจ้าหน้าที่พยาบาลซักประวัติ วัดสัญญาณชีพผู้รับบริการที่มาตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป
2. ส่งเข้าตรวจที่ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป
3. แพทย์แจ้งให้ทราบถึงการตรวจและเหตุผลที่ตรวจ
4. ให้ผู้รับบริการถอดกางเกงหรือกระโปรงออกทั้งหมด
5. ให้นอนบนเตียงตรวจ
6. จัดท่านอนตะแคงโค้งงอตัวเต็มที่ โดยสอดเข่าไว้เพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นปากทวารหนักได้ชัดเจน

วิธีการปฏิบัติ (Work Instruction) โรงพยาบาลจอมทอง	
วิธีการปฏิบัติเลขที่ : WI / NUR / OPD / 20	หน้า 4 จาก 6
เรื่อง : การรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก (Banding hemorrhoid)	

7. แพทย์จะใส่ถุงมืออย่างทางการแพทย์
8. ใส่สารหล่อลื่นบริเวณเครื่องมือ proctoscope ส่งให้แพทย์สอดใส่เข้าไปรูทวารหนักเพื่อทำการดูตำแหน่งของริดสีดวงทวารหนัก
9. เตรียมอุปกรณ์ให้แพทย์ Ballon ligater ใส่ยางรัดพร้อมส่ง
10. แพทย์จะใช้ Ballon ligater ใส่ยางรัดสอดผ่าน proctoscope เข้าไปเพื่อรัดหัวริดสีดวง
11. ขณะตรวจอาจสอบถามอาการที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการ
12. ขณะตรวจมักแจ้งผลการตรวจให้ผู้รับบริการทราบในขณะที่ตรวจ
13. เมื่อตรวจเสร็จ แพทย์จะเช็ดทำความสะอาดสารหล่อลื่นที่ปากทวารหนักผู้รับบริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (ต่อ)

14. ถอดถุงมือ ล้างมือเป็นอันสิ้นสุดการตรวจ
15. ผู้ช่วยแพทย์แจ้งให้ผู้รับบริการลุกนั่ง ลงจากเตียง แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยพูดคุยกับแพทย์ในเรื่องผลการรักษาต่อไป
16. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล
17. ลงรายการตรวจทางทวารหนักในระบบ HosxP
18. ออกใบนัดในผู้รับบริการ (ถ้ามี)
19. ให้คำแนะนำหลังทำการตรวจทางทวารหนักผู้รับบริการจะรู้สึกกระคายเคืองเล็กน้อย จะหายภายในระยะเวลาเป็นนาทีก่อน นอกจากนั้นทุกอย่างจะเป็นปกติ
20. ส่งไปรับยาที่ห้องยา

7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

8. เครื่องมือชี้วัด

ร้อยละของการประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบแนวทางการรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก

9. แบบตรวจสอบ

แบบตรวจสอบแนวทางการรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก

วิธีการปฏิบัติ (Work Instruction) โรงพยาบาลจอมทอง	
วิธีการปฏิบัติเลขที่ : WI / NUR / OPD / 20	หน้า 4 จาก 6
เรื่อง : การรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก (Banding hemorrhoid)	

แบบตรวจสอบ การรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก (Banding hemorrhoid)

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ผู้รับการประเมิน

ผู้ทำการประเมิน

กิจกรรม	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่พยาบาลซักประวัติ วัดสัญญาณชีพผู้รับบริการที่มาตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป			
2. ส่งเข้าตรวจที่ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป			
3. แพทย์แจ้งให้ทราบถึงการตรวจและเหตุผลที่ตรวจ			
4. ให้ผู้รับบริการถอดกางเกงหรือกระโปรงออกทั้งหมด			
5. ให้นอนบนเตียงตรวจ			
6. จัดท่านอนตะแคงโค้งงอตัวเต็มที่ โดยสอดเข้าไว้เพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นปากทวารหนักได้ชัดเจน			
7. แพทย์จะใส่ถุงมืออย่างทางการแพทย์			
8. ใส่สารหล่อลื่นบริเวณเครื่องมือ proctoscope ส่งให้แพทย์สอดใส่เข้าไปรูทวารหนักเพื่อทำการดูตำแหน่งของริดสีดวงทวารหนัก			
9. เตรียมอุปกรณ์ให้แพทย์ Ballon ligater ใส่ยางรัดพร้อมส่ง			

วิธีการปฏิบัติ (Work Instruction) โรงพยาบาลจอมทอง	
วิธีการปฏิบัติเลขที่ : WI / NUR / OPD / 20	หน้า 4 จาก 6
เรื่อง : การรัดหัวริดสีดวงทวารหนัก (Banding hemorrhoid)	

10.แพทย์จะใช้ Ballon ligater ใส่ยางรัดสอดผ่าน proctoscope เข้าไปเพื่อรัดหัวริดสีดวง 11. ขณะตรวจอาจสอบถามอาการที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการ 12. ขณะตรวจมักแจ้งผลการตรวจให้ผู้รับบริการทราบในขณะที่ตรวจ 13.เมื่อตรวจเสร็จ แพทย์จะเช็ดทำความสะอาดสารหล่อลื่นที่ปากทวารหนักผู้รับบริการ 14. ถอดถุงมือ ล้างมือเป็นอันสิ้นสุดการตรวจ 15. ผู้ช่วยแพทย์แจ้งให้ผู้รับบริการลุกนั่ง ลงจากเตียง แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยพูดคุยกับแพทย์ในเรื่องผลการรักษาต่อไป 16. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล 17. ลงรายการตรวจทางทวารหนักในระบบ HosxP 18. ออกใบนัดในผู้รับบริการ (ถ้ามี) 19. ให้คำแนะนำหลังทำการตรวจทางทวารหนักผู้รับบริการจะรู้สึกระคายเคืองเล็กน้อย จะหายภายในระยะเวลาเป็นนาที นอกจากนั้นทุกอย่างจะเป็นปกติ 20. ส่งไปรับยาที่ห้องยา			
---	--	--	--