



Morfine Wondgel

Bij palliatieve wondzorg

1 Indicaties

Lokale pijnbeheersing bij pijnlijke wonden.

De studies over de effecten van morfine zijn van (zeer) matige kwaliteit en laten tegenstrijdige effecten zien. Bij pijnklachten door huidulcera is systemische behandeling met analgetica de eerste keuzes. Bij onvoldoende effect kan lokale behandeling met morfinegel als aanvullende behandeling worden geprobeerd.

2 Dosering

1 tot 3 maal daags in ulcera aanbrengen

3 Toedieningsroute

Dermaal

4 Voor Toediening Gereed Maken

Benodigdheden:

- morfine hydrochloride voor injectie 10 mg (10 mg/ml, ampul à 1 ml)
- IntraSite gel 8 g
- apotheekpotje
- spatel

Breng 1 ml morfine injectievloeistof en 8 gram intrasitegel over in potje.

Meng goed met een spatel.

Afgesloten potje bewaren in koelkast.

Morfinegel is houdbaar gedurende 28 dagen.

5 Toedienen

Breng de gel aan met een schoon wattenstaafje.

6 Bijwerkingen

Bij meer dan 10% van de patiënten: onbekend

Bij 1-10%: onbekend

7 Bijzonderheden

Geen

8 Kwaliteitseisen thuistoediening

Voor toediening gereedmaken en voor toediening: Thuiszorg niveau 3 + IG.

Uitvoering handelingen conform Vilans protocollen.

9 Voorwaarden voor leveren van zorg

Uitvoeringsverzoek niet nodig

10 Bij vragen en of complicaties

Neem contact met een in de palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener

	Thuiszorgprotocol Morfine wondgel	Niveau: instructie Doc.nr.: CONCEPT Versie: xx
---	--	---

11 Achtergrondinformatie

De opname via de wond is verwaarloosbaar, morfine en metabolieten kunnen niet worden aangetoond in het bloed na lokale applicatie. Het is niet bekend of morfine een mogelijk ongunstig effect heeft op de wondgenezing. In de meeste studies werd een mix gebruik van morfine in IntraSite Gel. Zowel morfinesulfaat als diamorfine hydrochloride mengen goed met Intrasite gel en zijn stabiel voor 28 dagen. Bewaren kan bij kamertemperatuur en licht. De gel kan eenvoudig zelf worden gemengd door 1 ml morfine voor injecties (10 mg/ml) te mengen met 8 g IntraSite gel. IntraSite gel heeft extra absorptiecapaciteit en kan zelfs nog wel meer opnemen dan 1 ml.

Zie: [Morfine gel voor pijnlijke ulcera \(huidziekten.nl\)](http://Morfine%20gel%20voor%20pijnlijke%20ulcera%20(huidziekten.nl))

12 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

<i>Versie</i>	<i>Datum</i>	<i>Wijziging</i>
1	19-03-2025	Nieuw document
2		
3		