

Stribet Ryle

Opdateret 23/1-2019 LB

Sidste nyt

Opdateret 23/1-2019 LB

Det er verificeret, at Løgstør fugle er 3. Danske fund, året skal dog være 1955 (ældre SU obs). Siden publiceringen i Bladsmutten er der tilkommet 3 yderligere fund i Vestsjælland.

Første danske fund 21/7-1950 Amager. Salomonsen (1963) nævner yderligere to fund: 4/5 – 6/5 1952 Amager og 6/9 1956 Løgstør. I SU rapporten fra 1988 er fundet fra 1956 godkendt og omtales som det første i Danmark?

Næste observation kom først i 1975 ligeledes på Amager. Herefter gik der yderlige ti år inden det var tid for de to næste, bl.a. det første vestsjællandske fund, der dermed var det 6. fund i Danmark. Olsen (1992) angiver 14 fund t.o.m. 1990.

Arten udgik fra SU-listen i 2006, men må stadig anses for at være en rimelig sjælden fugl. En fuldstændig oversigt over fundene t.o.m. 2005 kan ses på www.netfugl.dk - også her refereres de tre ovenstående ældre fund, så det er rimeligvis bemærkning i SU-rapporten fra 1988 der er ukorrekt.

De vestsjællandske fund:

- 1 1985 6/7 og 26/7 1 Flasken, Reersø
- 2 1992 26/7 – 1/8 1 2k+ Borreby Mose
- 3 1998 17/10 – 18/10 1 1k Flasken, Reersø – stadig seneste danske fund.
- 4 2002 28/5 - 29/5 1 Borreby Mose
- 5 2005 23/7 1 2k+ Sevedø og 4/7 – 25/7 1 2k+ Borreby Mose (anses for samme fugl!)
- 6 2006 10/9 – 19/9 1k Lejsø
- 7 2009 13/6 – 15/6 1 Borreby Mose
- 8 2012 21/9 1k rast -> Hovvig
- 9 2013 25/4 1 Kobæk Sø
- 10 2018 5/8 1 Korshage

I DOF-basen er der 61 registreringer fra Vestsjælland dækkende fem af de seks seneste fund – 1985 og 1998 fuglene mangler. Grundet artens sjældenhed og dokumentationskrav, må ovenstående liste anses for at være 100% dækkende for situationen i vores område.

Den tidsmæssige og geografiske fordeling for samtlige danske fund ses af tabellen nedenfor. Arten er ikke registreret på Bornholm.

År	NJ	VJ	SVJ	SJ	ØJ + F	Øv Sj	Vest Sj	LFM	I alt	Min pr år	Max pr år
1950-59	1					2			3	0	1
1960-69									0	0	0
1970-79						1			1	0	1
1980-89	1	1	1		1	3	1		8	0	3
1990-94	4	3			1		1	1	10	0	5
1995-99	4	3	2			1	1	1	12	1	6
2000-04	14	8	2	1	3	2	1	3	28	3	7
2005-09	6	6	4	3	1	4	3	1	32	4	10
2010						2					

Sum	30	21	9	4	6	13	7	6	96		
-----	----	----	---	---	---	----	---	---	----	--	--

Bemærk de 4 første linier dækker 10 år, medens de næste fire kun dækker 5 år. Arten har været årlig siden 1992 og har siden været langsomt tiltagende, dog var 2010 ikke et specielt godt år – kun 2 fugle, hvilket er det laveste antal siden 1998.

Arten optræder lige så ofte i moser som ved kysten. Borreby Mose er et oplagt sted at lede, men hvad med moser i den nordlige del, såsom Trundholm Mose og Hovvig. Nordjylland er den region, der har flest fugle, så den Stribede Ryle burde også være muligt at finde på andre lokaliteter end de fire, hvor den allerede er set. En mulig forklaring på den geografiske fordeling af fundene kunne være, at der er to indfaldsveje for fuglene. En sydlig fra Østersøen syd om Sverige, der rammer Sydsjælland og Sydhavssøerne og en nordlig langs Norges kyst, der rammer Jylland. Dette burde give fugle i Jylland ved vestlige vinde, medens de østdanske fund burde komme i forbindelse med østenvind. Her ligger en opgave, hvis der er nogen, der har lyst til at grave dybere vedrørende forekomsten af Stribet Ryle – om ikke andet, kan teorien være interessant at have i baghovedet, når arten dukker op fremover.

Lokaliteter med observationer af Stribet Ryle ifølge DOF-basen.



Litteratur

Dybbro, Tommy 1978: Oversigt over Danmarks Fugle

Olsen, Klaus Malling 1992: Danmarks fugle – en oversigt

Salomonsen, Finn 1963: Oversigt over Danmarks Fugle

Fugleåret 2006 – 2009.

Rapportgruppens årsrapport i DOFT: 1999 – 2000 (2002:3), 2001 (2003:3), 2002 (2004:3), 2003 (2005:3) og 2004 (2006:4).

SU rapporter 1975 – 2005.