И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению средства Саноксин полоски
для дезакаризации ульев и соторамок

(Организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20, комн. 4)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. **Саноксин полоски** (**Sanoksin strips**) – средство, предназначенное для дезакаризации запасных ульев и сотовых рамок (суши) на пасеках.
2. Средство представляет собой полоски из фильтровального картона, пропитанные акарицидным раствором. В своём составе в качестве действующего вещества содержит щавелевую кислоту (7 г/полоску) и тимол (3 мг/полоску); в качестве вспомогательных веществ – масло пихты и глицерин; картон фильтровальный – в качестве основы.
3. По внешнему виду представляет собой полоски картона от белого до светло-янтарного цвета.
4. Выпускают расфасованными по 10 и 20 штук в герметичные полимерные пакеты и картонные коробочки.
5. Хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°С до 30°С. Срок годности при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.
6. Саноксин полоски следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованное средство по истечении срока годности утилизируют на общих основаниях в соответствии с требованиями законодательства.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

8. Входящие в состав средства щавелевая кислота и тимол обладают контактным акарицидным действием на клещей Varroa destructor.
В рекомендуемых режимах применения не оказывает отрицательного влияния на качество воска, соторамок, деталей ульев и пчелоинвентарь.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

9. Саноксин полоски применяют в целях уничтожения и предотвращения распространения на пасеке клещей Varroa destructor. Выпускают готовым к применению – методом развешивания полосок между рамками.
10. Средство применяют в условиях среднедневных температур воздуха 12–25°С для дезакаризации и дезинсекции запасных, предназначенных для расширения

гнёзд семей пчёл, гнездовых и магазинных корпусов ульев с днищами и крышками, с гнездовыми и магазинными соторамками.
11. Для 4–6 рамок в улье достаточно двух полосок, для 8–12 рамок используют 4 полоски. Через 30–40 дней обработку повторяют.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При работе с Саноксином полосками следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с химическими веществами. По окончании работы следует вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом. При случайном контакте рабочего раствора с открытыми участками кожи или слизистыми оболочками глаз или рта их следует немедленно обильно промыть проточной водой. Людям с гиперчувствительностью к щавелевой кислоте и другим компонентам средства следует избегать прямого контакта с Саноксином полосками. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании средства в организм человека следует немедленно обращаться в медицинское учреждение, имея при себе инструкцию по применению или упаковку средства.

Наименование и адреса производственных площадок производителя средства для ветеринарного применения	ООО «АПИ-САН», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4
Наименование, адрес организации, принимающей претензии от потребителя	ООО «АПИ-САН», г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20, комн. 4