

Nombre: Yacaré.



En Argentina habitan dos especies: el yacaré overo o ñato y el yacaré negro

Nombre científico: Yacaré overo: *Caiman latirostris*

Yacaré negro: *Caiman yacaré*

Los yacarés son carnívoros y los mayores predadores de los ríos, esteros y lagunas. Su alimentación se basa en aves acuáticas y pequeños mamíferos como coipos, nutrias y crías de carpinchos; ingieren principalmente caracoles otros moluscos y crustáceos, además de peces, a los que acecha inmóvil con la boca abierta para tragarlos cuando se ponen a su alcance.

Habitan ríos, arroyos, esteros, lagunas y zonas pantanosas. En especial en aguas calmas y con vegetación acuática. Los yacarés viven en el noreste argentino, su mayor distribución se encuentra en la Mesopotamia. Se pueden encontrar yacarés en la provincia de Misiones, Corrientes, Formosa y parte de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Salta. Algunos de los sitios donde se pueden observar colonias de yacarés son: Esteros del Iberá (Corrientes), Parque Nacional Iguazú (Misiones), Parque Nacional PreDelta (Entre Ríos), Río Pilcomayo (Formosa), Río Bermejo (Chaco) e Islas del Río Paraná (Santa Fe).

Los yacarés suelen salir a cazar de noche; es entonces cuando se muestran más activos. De día se tienden al sol, a la orilla de los ríos y en los bordes de los pantanos, y dormitan mientras el calor va entibiándoles los cuerpos. Los baños de sol son el modo que tienen los caimanes de regular su temperatura corporal que -como la de todos los reptiles- es variable y fluctúa según la temperatura ambiente, elevándose si el medio es caluroso y descendiendo cuando éste se enfría.

La época de reproducción empieza a comienzos del verano; los machos marcan su territorio y combaten para expulsar a los ejemplares más débiles. Después de la cópula el macho se desinteresa del proceso de gestación, y la construcción del nido queda exclusivamente a cargo de la hembra. El sitio elegido para anidar varía según la situación de las aguas. En años de grandes precipitaciones los nidos se construyen en la selva, al lado de bañados, charcas y esteros. En cambio, cuando el agua se mantiene en su nivel normal -y sobre todo en años de sequía- la nidada se ubica en islas dentro de los cauces de los ríos o en los pantanos. Depositarán entre 20 y 35 huevos; el nido toma la forma de un montículo de material orgánico de hasta un 1,5 m de diámetro. En cualquier caso es fundamental que el macho ignore la localización del nido, ya que no dudaría en saciar su apetito a costa de su propia cría.

La hembra cuida del nido durante los dos meses de la incubación, aunque en áreas de caza más o menos intensa puede abandonarlo. El calor necesario para los embriones proviene del sol y de la descomposición de la materia orgánica del nido.

Desde el momento de nacer y a veces incluso desde antes de salir del huevo, los pichones emiten gruñidos roncós. La madre, que se mantiene siempre cerca del nido, acude a este llamado y quita el techo de tierra y ramas que cubre a la nidada para que los recién nacidos puedan abrirse paso hacia la superficie.

Durante los primeros días de vida encuentran entre la materia orgánica en descomposición del nido suficientes larvas e insectos para satisfacer su apetito. La madre se encargará luego de conducirlos hasta el agua y continuará protegiéndolos de las cigüeñas y también de los adultos de la propia especie. Las crías de

los yacarés se mantienen más de un año en los alrededores del nido, bajo la vigilancia de una madre activa con la que se comunican por medio de ronquidos. Crecen lentamente: tardan cerca de dos años en alcanzar una longitud de treinta centímetros y varios años más en llegar a la madurez completa.

El número de yacarés ha disminuido notablemente a partir del momento en que el hombre inició la caza sistemática de la especie en busca del atractivo y pulido cuero de su vientre.

No sólo la caza ha contribuido a la vertiginosa reducción de la especie de los yacarés. Son capturados para el tráfico de mascotas, (en menor medida) su utilización alimenticia por parte de los pobladores locales; que ocasionalmente consumen los huevos y la destrucción de sus hábitats naturales ha tenido un efecto semejante. El avance de la agricultura y la ganadería sobre áreas antes silvestres en Corrientes y la tala de árboles en Misiones han modificado sensiblemente las condiciones para el desarrollo de la especie.

Distribución geográfica del yacaré



Trabajamos en la carpeta de Ciencias Naturales

Leé el texto informativo y responde

- 1) ¿Cuántos párrafos hay en el texto? Marcá en la lectura donde empieza y termina cada párrafo.
- 2) ¿De qué trata cada párrafo?
- 3) Escribí en el mapa el nombre de las provincias donde encontramos yacarés.
- 4) Realizá un mapa conceptual con las ideas más importantes del texto del yacaré.