

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 20 по 26 червня 2025 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – молочно-воскова стиглість. Ячмінь – воскова стиглість. Озимий ріпак – формування насіння. Горох – дозрівання. Кукурудза, соняшник, соя – листоутворення. Картопля - цвітіння. Сад – утворення плодів

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці хлібними клопами в середній чисельності 0,6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 50 % обстежених площ, середня чисельність личинок 1,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 29 % обстежених площ; личинками злакових трипсів в середній чисельності 2 екз. на колос заселено 2 % рослин на 19 % обстежених площ; личинками злакової п'яниці за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 1 % рослин на 16 % обстежених площ; злаковими попелицями в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин на 15 % обстеженої площі, хлібними жуками в середній чисельності 0,9 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 15 % обстежених площ. Борошнистою росю уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 5 % обстежених площ, бурю іржею уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 17 % обстежених площ, септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 3% на 62 % обстежених площ, піренофороз уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 0,1 % обстежених площ (1018 га).

В посівах озимого ячменю злаковими попелицями в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 91 % обстеженої площі, личинками злакових п'явиць за середньої чисельності 3 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин на 91 % обстежених площ. Гельмінтоспоріозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 9 % обстеженої площі, борошнистою росю уражено 10 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 3 % обстежених площ (173 га).

В посівах ячменю гельмінтоспоріозом уражено 30 % рослин з розвитком хвороби 15 % на 100 % (1 га).

В посівах озимого ріпаку личинками ріпаковим насіннєвим прихованохоботником в середній чисельності 5 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ (170 га).

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 69 % обстежених площ, злаковими попелицями в середній чисельності 6 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 75 % обстеженої площі (1021 га).

В посівах сої бульбочковими довгоносіками в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 80 % обстежених площ, попелицями в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин на 20 % обстеженої площі (76 га).

В посівах гороху попелицями в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 1 % рослин на 100 % обстеженої площі (92 га).

В посівах соняшнику личинками лучного метелика в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 19 % обстежених площ, буряковою попелицею в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 51 % обстеженої площі. Пероноспорозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 19 % обстеженої площі, септоріозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 24 % обстеженої площі, фомозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 4 % обстеженої площі, іржею уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 13 % обстеженої площі (948 га).

На присадибних ділянках у ранній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 8 екз. на заселену рослину пошкоджено 10 % рослин, капустяною білокрилкою в середній чисельності 10 екз. на заселену рослину пошкоджено 100 % рослин.

Колорадським жуком в середній чисельності 2 екз. на кущ заселено і пошкоджено 1 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 2 % кущів, личинками в середній чисельності 3 шт. на кущ в середньому заселено 6 % кущів. Фітофторозом уражено 2 % кущів картоплі з розвитком хвороби 1 % (присадибні ділянки).

В плодovих садах яблуневою попелицею в середній чисельності 4 екз. на лист пошкоджено 4 % листків в середньому на 50 % дерев, яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 10 % плодів в середньому на 1 % дерев на 100 % площ. Парша уражено 2 % листків з розвитком хвороби 1 % та 2 % плодів з розвитком хвороби 1% на 30 % дерев (4 га).