

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 29 серпня по 04 вересня 2025 року.

Кукурудза – воскова та повна стиглість. Соя – 1 та 2 етапи дозрівання. Соняшник – біологічна стиглість. Озимий ріпак – сходи. Яблуня – ріст плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 37 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин на 44 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на качанах – 58, на стеблах – 42 %) на 50 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на качанах – 89 %, на волоті – 11 %) на 25 % обстежених площ, фузаріозом уражено 6 % качанів на 60 % обстежених площ, бактеріозом уражено 2 % качанів з розвитком хвороби 1 % на 26 % обстежених площ (713 га).

В посівах сої аскохітозом уражено 10 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 100 % обстеженої площі (35 га).

В посівах соняшнику гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 15 % рослин на 18 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин на 2 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки за середньої чисельності 1 екз. на кошик в середньому заселено і пошкоджено 4 % рослин на 2 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 18 % обстежених площ, фомозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 28 % обстежених площ, іржею уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 11 % обстежених площ, фомопсисом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 10 % обстежених площ, борошнистою росою уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 6 % обстежених площ, сухою гниллю уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 8 % обстежених площ, білою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма – 39 %, стеблова – 25 %, кошикова – 36 %) з розвитком хвороби 1 % на 13 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 3 % рослин (прикоренева форма – 43 %, стеблова – 13 %, кошикова – 44 %) з розвитком хвороби 1 % на 13 % обстежених площ (1373 га).

В посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 5 екз. на заселену рослину пошкоджено 13 % рослин на 100 % обстежених площ (203 га).

Фітофторозом уражено 25 % рослин томатів з розвитком хвороби 18 % (присадибні ділянки).

Антракнозом уражено 6 % рослин огірків з розвитком хвороби 4 %, бактеріозом уражено 13 % рослин з розвитком хвороби 4 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у пізній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 8 екз. на заселену рослину пошкоджено 37 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,1 екз. на заселену рослину пошкоджено 4 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 9 екз. на заселену рослину пошкоджено 90 % рослин, гусеницями капустяного білана в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину пошкоджено 1 % рослин, капустяною білокрилкою в середній чисельності 7 екз. на заселену рослину пошкоджено 7 % рослин.

В плодкових садах паршею уражено 9 % листків з розвитком хвороби 7 % та 5 % плодів з розвитком хвороби 4 % на 28 % дерев на 100 % обстежених площ, плодовою гниллю в середньому уражено 26 % плодів падалиці під 90 % дерев на 80 % обстеженої площі (5 га).

На площах з-під зернових колосових культур середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 3 на 78 % обстеженої площі 320 га.