

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 27 жовтня по 02 листопада 2023 року.

Озима пшениця – сходи. Озимий ріпак – 2-4 листка, утворення розетки.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 0,5 % рослин на 11 % обстежених площ, личинками хлібної жужелиці за середньої чисельності – 0,8 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин озимої пшениці на 15 % обстежених площ, злаковою попелицею в середній чисельності 3 екз. на рослину в середньому пошкоджено 1 % рослин на 15 % обстежених площ (470 га).

У посівах озимого ріпаку попелицею в середній чисельності 3 екз. на рослину в середньому пошкоджено 1 % рослин на 16 % обстежених площ, гусеницями капустяної молі в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 29 % обстежених площ. Альтернاریозом уражено 7 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 5 % на 17 % обстежених площ, білою плямистістю уражено 1 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 1 % на 16 % обстежених площ, фомозом уражено 2 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 1 % на 29 % обстежених площ (344 га).

На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію – 3 на 15 % обстеженої площі 344 га. На площах озимого ячменю середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію – 3 на 100 % обстеженої площі 142 га. На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію – 1 на 74 % обстеженої площі 470 га. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 3, нір на колонію 5 на 100 % обстеженої площі 88 га. На площах з-під кукурудзи середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 2, нір на колонію 4 на 100 % обстеженої площі 88 га. На площах з-під зернових колосових культур середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 3, нір на колонію 4 на 100 % обстеженої площі 25 га.