

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 21 по 27 жовтня 2022 року.

Озима пшениця – сходи. Озимий ріпак – утворення листкової розетки.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 75 % обстежених площ, личинками хлібної жужелиці в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 36 % обстежених площ, яйцекладками злакової попелиці за середньої чисельності 2 яйця на рослину в середньому заселено 2 % рослин на 17 % обстежених площ (237 га).

У посівах озимого ріпаку капустяною попелицею в середній чисельності 4 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин на 16 % обстежених площ, гусеницями капустяної молі в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин на 47 % обстежених площ. Альтернатіозом уражено 8 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 6 % на 16 % обстежених площ, фомозом уражено 5 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 1 % на 47 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 1 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 1 % на 16 % обстежених площ, білою плямистістю уражено 2 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 1 % на 16 % обстежених площ (329 га).

На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 2 на 68 % обстеженої площі 257 га. На площах з-під кукурудзи середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 3, нір на колонію – 5 на 100 % обстеженої площі 115 га. На площах кукурудзи середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, нір на колонію – 4 на 100 % обстеженої площі 166 га. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, нір на колонію – 6 на 100 % обстеженої площі 100 га. На неорних площах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 4 на 100 % обстеженої площі 2 га.