



Ensino Médio

2ª Série



PROFESSOR(A):

TÉRCIO CÂMARA



DISCIPLINA:

BIOLOGIA



CONTEÚDO:


**OS FUNDAMENTOS DO
PATRIMÔNIO GENÉTICO**



DATA:

24/03/2022


POSSÍVEIS TRANSFUSÕES



O fator Rh


Existem dois fenótipos para o fator Rh, motivo pelo qual passa a ser considerado um caso de herança mendeliana simples. O gene *R*, dominante, determina a presença do fator Rh, enquanto o gene *r*, recessivo, condiciona a ausência do referido fator.

Genótipos	Fenótipos
Rh ⁺	RR ou Rr
Rh ⁻	rr



Eritroblastose Fetal ou D.H.R.N

Uma doença provocada pelo fator Rh é a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, caracterizada pela destruição das hemácias do feto ou do recém-nascido. As conseqüências dessa doença são graves, podendo levar a criança à morte.



QUESTÃO – 01

GABARITO
C

Existem quatro tipos sanguíneos na espécie humana: A, B, AB e O. Eles são codificados graças a três alelos, o que representa um caso de:

- a) epistasia.
- b) mutação.
- c) alelos múltiplos.
- d) pleiotropia.
- e) aberrações cromossômicas

QUESTÃO – 02

GABARITO
C

Os tipos sanguíneos do sistema ABO são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue tipo A, por exemplo, possui como principal característica a presença:

- a) de aglutinogênio B.
- b) de aglutinina anti-A.
- c) de aglutinina anti-B.
- d) de aglutinina anti-A e anti-B.
- e) de aglutinogênio A e B.

QUESTÃO – 03

GABARITO
B

Compreender o sistema ABO é fundamental para evitar possíveis danos à saúde no momento de uma transfusão sanguínea. Imagine, por exemplo, que uma pessoa com sangue tipo A receba sangue do tipo B. Essa ação poderia ocasionar a morte do indivíduo, uma vez que podem ser formados aglomerados de hemácias que obstruem a passagem do sangue. Isso ocorre porque:

- a) as hemácias do doador possuem aglutininas anti-A, que atacam a hemácia do receptor.
- b) no plasma do receptor existem aglutininas anti-B, que atacam as hemácias do doador.
- c) no plasma do doador existe aglutininas anti-B, que atacam as hemácias do receptor.
- d) as hemácias do doador possuem aglutinogênios B, que reagem com os aglutinogênios A das hemácias do receptor.
- e) no plasma do doador existem aglutininas anti-A e anti-B, que atacam as hemácias do receptor.

QUESTÃO – 04

GABARITO
B

Os alelos que condicionam os tipos sanguíneos podem ser combinados em seis diferentes tipos: $I^A I^A$, $I^A i$, $I^B I^B$, $I^B i$, $I^A I^B$ e ii . Entre os alelos I^A e I^B existe uma relação de _____, pois ambos expressam-se.

- a) epistasia.
- b) codominância.
- c) dominância.
- d) heterozigose.
- e) recessividade.

QUESTÃO – 05

GABARITO
D

Imagine que um homem de tipo sanguíneo O case-se com uma mulher de sangue tipo AB. Qual é a probabilidade de esse cruzamento gerar descendentes de sangue tipo O?

- a) A probabilidade é nula, pois esse cruzamento só originará descendentes A, B e AB.
- b) A probabilidade é 100%, pois o alelo que condiciona o sangue tipo O é dominante.
- c) A probabilidade é 50%, pois metade dos genes do descendente é da mãe e metade, do pai.
- d) A probabilidade é nula, pois os descendentes gerados poderão ter apenas os genótipos $I^a i$ e $I^b i$.
- e) A probabilidade é 25%, pois esse cruzamento poderá gerar descendentes A, B, AB ou O.

QUESTÃO – 06

GABARITO
E

Os tipos sanguíneos do sistema ABO de três casais e três crianças são mostrados a seguir.

CASAIS

- I. AB X AB
- II. B x B
- III. A X O

CRIANÇAS

- a. A
- b. O
- c. AB

Sabendo-se que cada criança é filha de um dos casais, a alternativa que associa corretamente cada casal a seu filho é:

- a) I-a; II-b; III-c;
- b) I-a; II-c; III-b;
- c) I-b; II-a; III-c;
- d) I-c; II-a; III-b;
- e) I-c; II-b; III-a

QUESTÃO – 07

GABARITO
D

Assinale a afirmativa **incorreta**:

- a) Pessoas pertencentes ao grupo sanguíneo B possuem aglutinogênios B em suas hemácias e aglutinina anti-A em seu plasma sanguíneo.
- b) Pessoas do grupo sanguíneo AB podem ser chamadas de receptores universais por não apresentarem nenhum tipo de aglutininas em seu plasma sanguíneo.
- c) Pessoas do grupo sanguíneo do tipo B podem doar sangue para pessoas com os tipos sanguíneos do tipo B e AB e podem receber de B e O.
- d) Pessoas do tipo sanguíneo do tipo O apresentam aglutinogênios do tipo anti-A e anti-B e por isso são chamados de doadores universais.

QUESTÃO – 08

GABARITO
C

O fator Rh está relacionado a um problema grave conhecido como eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, na qual anticorpos produzidos pela mãe atravessam a placenta e agem contra as hemácias do feto. Sobre esse problema, marque a alternativa correta:

- a) Na eritroblastose fetal, a mãe é Rh negativo, assim como o pai da criança.
- b) A eritroblastose fetal ocorre apenas em mulher Rh positivo.
- c) A eritroblastose fetal só acontece em mulheres previamente sensibilizadas.
- d) A eritroblastose fetal pode ser prevenida com a aplicação de sangue Rh positivo na mãe logo após o parto da segunda criança positiva.
- e) A eritroblastose fetal ocorre apenas em filhos Rh negativos.

QUESTÃO – 09

GABARITO
B

O fator Rh é condicionado por dois alelos que possuem dominância completa. O R é dominante e determina o sangue Rh positivo, enquanto o r é recessivo e determina o sangue Rh negativo. Diante dessa afirmação, marque a alternativa incorreta.

- a) Pais Rh negativo terão filhos apenas Rh negativos.
- b) Pais Rh positivos não podem ter filhos negativos.
- c) O indivíduo heterozigoto é Rh positivo.
- d) Pai homozigoto dominante e mãe homozigota recessiva sempre terão filhos Rh positivo.
- e) Pais homozigotos dominantes só terão filhos Rh positivos.

QUESTÃO – 10

GABARITO
C

Imagine que uma mulher Rh positiva heterozigota para essa característica tenha um filho com um homem Rh negativo. Qual a probabilidade de nascer uma criança Rh positiva?

- a) 0%
- b) 25%
- c) 50%
- d) 75%
- e) 100%



Ensino Médio

2ª Série

ATÉ A PRÓXIMA AULA!



**Canal
Educação**
PROGRAMA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA