

Patientforløb for A-tenotomi ved ponseti-behandling.	
	Forudgået A-tenotomien er barnet fulgt gennem flere gipsninger. Det er en lægelig vurdering hvornår i forløbet A-tenotomien skal udføres.
1 dags indlæggelse	Barnet møder 2 timer før indgrebet i fysioterapien, afsnit 3002, til gipsfjernelse
Sygeplejersken	1. barnet møder herefter på 3083. Barnet vejes, og vægten føres i SP
	2. Barnet kan evt. få vasket tæer/hurtigt bad.
	3. Der lægges EMLA omkring Achillessenen, dette skal sidde på i min. 1 time.
	4. Der gives Pcm 10 mg/kg Supp. Ordineres som sygeplejeordination.
	5. Tiden til indgrebet er aftalt med læge, fysioterapeut samt gipsetekniker.
	6. Vær opmærksom på om der er sukkervand 24% i køleskabet.
Indgreb i skolestuen	
Sygeplejersken	1. Midazolam 0,3 mg/kg gives 15 min. inden indgrebet, ordineres af den opererende læge i SP og gives herefter af sygeplejersken
	2. Sukkevand koncentration 4% gives i en 10-20 ml sprøjte til hvis barnet har behov for at blive beroliget under forberedelserne til indgrebet.
	3. Sukkevand koncentration 24% gives i en 1-2 ml sprøjte 2 min. før indgrebet, for at have beroligende/smertestillende virkning. Sukkevand i 24% opløsning gives som dråber ved siden af sutten.
	4. Sygeplejersken assisterer ved operationen, fysioterapeuten er ikke nødvendigvis til stede.
	5. Blødningen stoppes - Ny gips ved fysioterapeut samt gipsetekniker.

Observationer i afdelingen	
	1. Barnet skal blive i afdelingen i 2 timer, hvor der observeres for blødning og almen tilstand efter Midazolam-rus.
	Udarbejdet af: sygeplejerske Ikram Fadail og Ditte Bokelund.
	Dato: april 2009, revideret februar 2017 v sygeplejerske Signe Broholm og overlæge Klaus Hindsø + revisioner 12/12/18
	Godkendt af: overlæge Klaus Hindsø samt fysioterapeut Lise Karlsmark.